

T

| | |
|----------------------------|--|
| T | unda T pe electrocardiogramă. |
| T₃ | abr. triiodotironină. |
| T₄ | abr. tetraiodotironină. |
| T.A. | abr. tensiune arterială. |
| TAB | vaccin TAB. |
| TABACHERA ANATOMICĂ | depresiune eliptică a tegumentelor părții posterolaterale externe a pumnului, determinată de tendoanele mușchilor extensori lung și scurt al policelui. |
| TABAGISM | intoxicație cu nicotină; poate fi acută (amețeli, paloare, vomismente) sau cronică (palpitații, dureri de tip anginos, nervozitate, insomnie, scăderea memoriei, leziuni vasculare, bronșită). |
| TABC | v. vaccin TABC (antitifoparatifoidic). |
| TABDT | v. vaccin TABDT. |
| TABES | boală de origine sifilitică; caracterizată prin încoordonare motorie. |
| TABETIC | suferind de tabes. |
| TABETIFORM | care seamănă cu tabesul. |
| TABLĂ | țesut osos compact care formează fața externă și internă a oaselor bolții craniene; între cele două tăblii se află țesut spongios intermediar. |
| TABLETĂ | preparat farmaceutic medicamentos solid, aplatizat, rectangular sau rotund, având conținut ridicat în zahăr și destinat a se dizolva în gură. |
| TAC (TACO) | v. tomodensitometrie. |
| TACT | simț care asigură percepția stimulilor mecanici asupra pielii sau mușchilor. |
| TACTIL | (lat. <i>tactilis</i> – care poate fi pipăit, atins), aparținând simțului pipăitului. |
| TACTISM | sin. taxie, mișcare orientată a organismelor sau organelor, care răspund la stimuli externi. |
| T.A.D. | abr. tensiune arterială diastolică. |
| TAENIA | gen de viermi paraziți din familia <i>Taeniidae</i> , clasa <i>Cestoda</i> . |
| TAGMATA | (sing. tagma), regiuni, părți, segmente diferențiate ale corpului, la artropode: cap, torace, abdomen. |
| TAHIARITMIE | aritmie cu frecvență cardiacă mare. |
| TAHICARDIE | același termen ca tahicardie, peste limitele fiziologice corespunzătoare vârstei, sexului și stării de antrenament. |
| TAHIFEMIE | pronunție exagerat de rapidă a cuvintelor. |
| TAHIFILAXIE | fenomen constând din diminuarea progresivă a răspunsurilor la o substanță farmacodinamic activă. |
| TAHIKINEZIE | rapiditate anormală a mișcărilor voluntare. |

MIC DICȚIONAR BIO-MEDICAL

*Cristina R.T.,
Dumitrescu Eugenia,
Teușdea V.,
Boboloaca I.*

| | |
|----------------------------|--|
| TAHILALIE | sin. tahifemie. |
| TAHIPNEE | sin. polipnee; respirație cu frecvență crescută. |
| TAHISISTOLIE | accelerarea sistolelor cardiace la o frecvență mai mare de 100/minut. |
| TAKATA-ARA (REAȚIA) | reacția de precipitare a unor seruri în prezența unei soluții de sublimat de fuxină; ar indica o tulburare funcțională hepatică și ar însoți inversiunea raportului serine/globuline. |
| TAL | corpul vegetativ, nediferențiat în rădăcină, tulpină și frunze, la plantele inferioare, care poate fi alcătuit dintr-o celulă multinucleată sau din mai multe celule care alcătuiesc o structură filamentoasă lățită, simplă sau ramificată. |
| TALALGIE | durere localizată la călcâi. |
| TALAMIC | referitor la talamus. |
| TALAMUS | <ol style="list-style-type: none">1. (lat. <i>thalamus – pat nupțial</i>) fiecare din cei doi nucleii voluminoși de substanță cenușie, situați de o parte și de alta a cavității celui de al treilea ventricul;2. proeminență osoasă a feței superioare a calcaneului, care suportă fațeta articulară posterioară a astragalului. |
| TALASEMIE | anemie hemolitică prin defect corpuscular datorată persistenței hemoglobinei fetale. |
| TALASOTERAPIE | exploatarea în scopuri terapeutice a apei mării, aerului și climatului marin. |
| TALBOT (REAȚIA) | dozarea pregnandiului în urină. |
| TALC | silicat de magneziu hidratat, care se prezintă ca o pulbere foarte fină, unsuroasă la pipăit; utilizat ca diluant solid pentru împrăștierea pulberilor insecticide. |
| TALCOM | tumora provocată de prezența accidentală a talcului într-un țesut. |
| TALIDOMIDĂ | hipnotic și sedativ recunoscut ca teratogen în 1961, administrarea sa la gravide a provocat numeroase malformații fetale, produsul a fost retras imediat. |
| TALIE | înălțimea corpului de la vertex la sol. |
| TALOFITE | una dintre cele două grupe mari în care este împărțit regnul vegetal; cuprinde plante inferioare, nediferențiate în tulpină, rădăcină și frunză, le lipsește sistemul conducător organizat și al căror corp vegetativ este un tal; cuprinde algele și ciupercile alături de care se includ și lichenii, bacteriile și mixomicetele. |
| TALON-GENUNCHI | probă în neurologie pentru precizarea gradului de coordonare a mișcărilor voluntare ale membrelor inferioare; bolnavul cu ochii închiși trebuie să atingă cu călcâiul genunchiul celuilalt picior. |
| TAMPON | <ol style="list-style-type: none">1. bucată de vată sau tifon aplicată pentru oprirea unei hemoragii;2. substanță care stabilizează pH-ul unei soluții chiar dacă se adaugă un acid sau bază. |
| TAMPONADĂ | comprimarea brutală a inimii prin revărsat pericardic rapid constituit. |
| TAMPONAJ | <ol style="list-style-type: none">1. acțiunea de tamponare a unei leziuni sângerânde cu un tampon,2. acțiunea de adăugare a unei soluții tampon într-o reacție chimică în scopul menținerii unui pH la o valoare dorită. |
| TAMPONARE | introducerea într-o cavitate naturală sau patologică, de tamponane bine presate, în scopul opririi unei hemoragii, a obținerii unui efect antiinflamator sau pentru a favoriza închiderea ulterioară a cavității. |
| TANATOLOGIE | o sumă de cunoștințe privind moartea, studiul morții sub toate aspectele sale, mai ales din punct de vedere medicolegal. |
| TANIN | substanță cu gust astringent, de origine vegetală, solubilă în apă, dizolvată în sucul celular; taninul este un derivat fenolic, acumulat mai ales în coajă (stejar, molid etc.), frunze (îndeosebi în gale) sau fructele necoapte. |
| TANOTOPRAXIE | sin. îmbălsămare. |

| | |
|-------------------------------|--|
| TAPET | <ol style="list-style-type: none"> 1. la plantele vasculare strat de celule cu rol nutritiv care învelește țesutul sporogen din sporangiu; 2. la animale, stratul pigmentar al coroidei care are rol nutritiv în special pentru retină. |
| TAPETORETINIAN | care se raportează, din punct de vedere anatomic și funcțional, la pătura pigmentară a retinei și, prin extensie, la retină și la coroidă. |
| TAR | abr. pentru tensiunea arterială retiniană. |
| TARAT | purtător al unei anomalii ereditare. |
| TARĂ | anomalie ereditară susceptibilă a produce o diminuare a rezistenței organismului sau o tulburare funcțională. |
| TARDIGRADE | grup de animale foarte mici, de circa 350 de specii cuprinse în încrengătura artropodelor, de formă cilindrică scurtă, cu număr mic de picioare, ce se deplasează greoi; sunt acvatice și semiacvatice, trăind mai ales prin locuri umede cu mușchi, licheni, unele ierburi. |
| TARDIV | înșușire fiziologică care exprimă o creștere și dezvoltare mai înceată și atingerea maturității corporale mai târziu. |
| TARS | <ol style="list-style-type: none"> 1. (gr. <i>tarsos</i> – <i>împletitură, laba piciorului</i>) ansamblu osos al părții posterioare a labei piciorului, format din 7 oase scurte, dispuse pe două rânduri, unul anterior și altul posterior; 2. segment al labei piciorului cuprins între extremitatea inferioară a gambei și baza oaselor metatarsiene; 3. tars palpebral; lamelă de țesut conjunctiv relativ dens, de formă semilunară, care constituie marginea liberă a ploapei superioare și inferioare. |
| TARSALGIE | durere localizată la tars. |
| TARSECTOMIE | <ol style="list-style-type: none"> 1. ablația unuia sau mai multor oase tarsiene; 2. rezecția parțială a tarsului palpebral. |
| TARSIAN | <ol style="list-style-type: none"> 1. care se raportează la tarsul piciorului, 2. care se referă la tarsul palpebral. |
| TARSITĂ | inflamația tarsului palpebral. |
| TARSOMETATARSIAN | care se referă la tars și la metatars. |
| TARSOPLASTIE | <ol style="list-style-type: none"> 1. operație reparatorie a labei piciorului practicăată pe tars, 2. sin. blefaroplastie. |
| TARSOTOMIE | <ol style="list-style-type: none"> 1. incizie la nivelul tarsului fără ablație osoasă; 2. sin. blefarotomie; 3. rezecție parțială a tarsului palpebral pentru corecția unui entropion. |
| TARTRU | <ol style="list-style-type: none"> 1. depozit format din substanțe organice și săruri de calciu, aderent la suprafața dintelui, cu precădere în regiunea coletului; 2. depozit aderent, în general dur și compact, provenit dintr-o apă cu conținut crescut de săruri calcare. |
| T.A.S. | abr. tensiune arterială sistolică. |
| TAUSSIG-BING (SINDROM) | malformație cardiacă congenitală caracterizată anatomic prin transpoziție vasculară parțială, aorta ieșind din ventriculul drept, artera pulmonară deviată la stânga, situată peste o comunicație interventriculară înaltă, clinic se traduce prin boala albastră precoce. |
| TAUTOMERIE | (gr. <i>tauto</i> – <i>același; meros</i> - <i>parte</i>), schimbarea reversibilă a unor legături și atomi în special de hidrogen, astfel, bazele azotate, se pot afla într-o stare normală și una tautomerică. |
| TATONARE | acțiunea de a tatona. |
| TAXIE | (gr. <i>taxis</i> – <i>aranjare, ordine</i>), reacție de locomoție la un animal mobil, sub efectul unui agent extern fizic sau chimic. |

MIC DICȚIONAR BIO-MEDICAL

*Cristina R.T.,
Dumitrescu Eugenia,
Teușdea V.,
Boboloaca I.*

| | |
|----------------------------------|--|
| TAXIS | reducerea manuală a unei hernii. |
| TAXON | termen care indică orice unitate taxonomică definită, independent de mărimea sau poziția ei în clasificarea plantelor și animalelor. |
| TAXONOMIE | <ol style="list-style-type: none">1. (gr. <i>taxis</i> –<i>aranjare</i>; <i>nomos</i> - <i>lege</i>) știința care cuprinde legile clasificării organismelor vii;2. studiul unor grupe de plante sau de animale din punct de vedere al descrierii și clasificării speciilor. |
| T.C. | abr. traumatism crani.al |
| T.C.C. | abr. traumatism craniocerebral. |
| T.C.T. | abr. tirocalcitonină. |
| T.D.M. | abr. tomodensitometrie. |
| T.E. | <ol style="list-style-type: none">1. abr. tomografie de emisie;2. abr. transfer de embrioni. |
| TEACĂ | învelișul conjunctiv care în ovar îmbracă ovulul și celulele foliculare. |
| TEBAIC | referitor la opiu sau care se prepară pe bază de opiu. |
| TECAL | referitor la teacă. |
| TECTOSPINAL | care se referă la acoperișul mezencefalului și la măduva spinării. |
| TECTRICE | pene propriu-zise de contur cu lama întreagă, situate pe aripi și în coadă și care, având dimensiuni diferite, acoperă ca și țiglele baza remigelor și a rectricelor. |
| TEGUMENT | <ol style="list-style-type: none">1. (lat. <i>tegumen</i> – <i>acoperiș</i>, <i>înveliș</i>) țesut care acoperă un organism;2. înveliș extern, protector, al semințelor, provenite din transformarea integumentelor ovulului. |
| TEHNICA DUBLULUI CONTRAST | tehnică constând în umplerea unei cavități digestive cu aer și tapetarea pereților săi cu un produs fin opac. |
| TEHNICĂ | <ol style="list-style-type: none">1. ansamblu de procedee metodice utilizate pt. obținerea unui rezultat dorit;2. în chirurgie, ansamblu de timpi operatori. |
| TELANGIECTAZIE | dilatație a micilor vase din derm, formând o rețea fină roșie. |
| TELECOBALTOTERAPIE | tratament cu raze gama obținute cu o bombă conținând o capsulă de cobalt radioactiv, plasată la distanță de bolnav. |
| TELEDIASTOLIC | care se referă la ultima parte a diastolei. |
| TELEGONIE | impregnarea maternă, de la împerecherea inițială, respectiv influența asupra unei femele, de către primul mascul, astfel că descendenții proveniți ulterior, din alte împerecheri, se aseamănă cu primul genitor. |
| TELEIRADIERE | iradiere la distanță. |
| TELENCEFAL | ansamblul celor două emisfere cerebrale. |
| TELEOFAZĂ | faza ultimă a cariochinezei, în care odată cu apariția peretelui despărțitor în partea mediană a celulei, se formează cele două celule fiice. |
| TELEOLOGIE | (gr. <i>teleos</i> – <i>scop</i> ; <i>logos</i> - <i>discurs</i>), concepție antiștiințifică potrivit căreia adaptarea organismelor la mediu are un anumit scop și că evoluția ar fi și ea intenționată, premeditată; finalism, teoria finalității, revelarea scopurilor. |
| TELEOPTIL | penaj propriu-zis; cuprinde penajul juvenil, din prajma îmbrăcare după puful embrionar cât și penajul de adult. |

| | |
|---------------------------------|---|
| TELEOSTEENI | (gr. <i>teleos</i> – <i>complet</i> ; <i>osteon</i> - <i>os</i>), grup de pești osoși, care cuprinde marea majoritate a speciilor actuale, marine și dulcicole. |
| TELERADIOSCOPIE | sin. cu radioscopie televizată. |
| TELERADIOTERAPIE | tratament cu raze X sau alte radiații ionizate a căror sursă este plasată la o distanță mai mare de 1,5 m față de organism. |
| TELERECEPTOR | receptor senzorial sensibil la o acțiune care are loc la distanță, cu receptorii auditivi, vizuali și parțial receptorii termici și olfactivi. |
| TELESISTOLIC | care se referă la ultima parte a sistolei. |
| TELETERAPIE | tratament efectuat la distanță de bolnav, ca în cazul tratamentului cu raze X. |
| TELETEZĂ | aparat destinat să îndeplinească acțiuni comandate de la distanță de un bolnav cu infirmități motorii grave, prin intermediul unor mișcări încă posibile. |
| TELEVIZIUNE RADIOSCOPICĂ | sin. radioscopie televizată. |
| TELOBLASTIE | tip de formare a mezodermului sau mezoblastului la metazoarele protostomiene, începând de la câteva celule inițiale teloblaste; proliferarea teloblastelor dă veziculele mezodermului din care se dezvoltă cavități care constituie cavitatea celomică, mai mult sau mai puțin metamerizată, sau cavitatea generală secundară a corpului. |
| TELEOCENTRIC | cromozom sau cromatidă cu centromerul situat terminal. |
| TELOFAZĂ | ultima fază a unei mitoze sau a unei diviziuni meiotice. |
| TELOMER | structură dotată cu proprietăți particulare, care ocupă extremitatea liberă a unui cromozom. |
| TELSON | segment abdominal terminal, nepereche, la diferite grupe de artropode; țepul caudal în vârful căruia se deschid glandele veninoase ale scorpionilor. |
| TELURIC | care se referă la pământ și la influența sa asupra bolilor. |
| TEMPERAMENT | ansamblul particularităților fiziologice, morfologice și psihice, care diferențiază indivizii între ei și influențează caracterul și comportamentul. |
| TEMPERATURĂ | grad al intensității căldurii măsurat cu ajutorul termometrului. |
| TEMPERATURĂ BAZALĂ | temperatura corporală măsurată la deșteptare, înainte de sculare și mâncare. |
| TEMPERATURĂ CORPORALĂ | temperatura corpului rezultând din echilibrul dintre producția de căldură și pierderea căldurii. |
| TEMPERATURĂ CRITICĂ | temperatura mediului la care sistemul de termoreglare al homeotermelor este solicitat fie pentru mărirea producției de căldură, fie pentru pierderea ei din organism. |
| TEMPORAL | 1. care se referă la osul temporal; 2. os temporal: os situat în partea inferioară și laterală a craniului, în spatele sfenoidului subparietal și înainte occipitalui. |
| TEMPORAL SUPERFICIAL | nerv desprins din ramura mandibulară a trigemenului, anastomozată sub arcada zigomatică cu facialul pentru a forma plexul subzigomatic, distribuindu-se apoi pielii zonale. |
| TEMPOROFACIAL | care se referă la tâmplă și la față. |
| TEMPOROMALAR | care se referă la tâmplă și la obraz, sau la osul temporal și osul mandibular. |
| TEMPOROMANDIBULAR | care se referă la temporal și la mandibulă, ex. articulația temporo-mandibulară. |
| TEMPOROMAXILAR | care se referă la osul temporal și la osul maxilar. |
| TEMPOROPARIETAL | care se referă la oasele temporal și parietal sau la circumvoluțiunile temporale și parietale. |
| TEMPOROPONTIN | care se referă la lobii temporali și la protuberanța inelară (<i>puntea Varoli</i>). |
| TEMPOROSPAȚIAL | care se referă la timp și spațiu. |

| | |
|-----------------------------------|--|
| TENALGIE | durere localizată la un tendon. |
| TENAR | v. eminență tenară. |
| TENDINITĂ | afecțiune inflamatorie a tendonului. |
| TENDINOS | 1. de natură tendinoasă; 2. care se referă la tendoane. |
| TENDON | partea terminală, distală sau proximală, a unui mușchi, formată din țesut conjunctiv alb, dens și rezistent, prin care mușchiul se inseră la os. |
| TENDON CONJUNCT | tendon terminal comun alcătuit din fibrele mușchilor transvers și micul oblic abdominal, cu inserție pe pubis și simfiza pubiană, înaintea mușchiului mare drept abdominal. |
| TENDON PERFORANT | 1. fiecare din cele 4 tendoane terminale ale mușchilor flexor comun profund al degetelor care, la fața palmară a celei de a doua falange, perforază tendonul corespunzător flexorului comun superficial al degetelor; 2. fiecare din cele 4 tendoane terminale ale mușchiului lung flexor comun al degetelor piciorului, a căror poziție anatomică este identică celei a tendoanelor perforante ale degetelor mâinii în raport cu tendoanele terminale ale mușchiului scurt flexor plantar. |
| TENDON PERFORAT | 1. fiecare din cele 4 tendoane terminale ale mușchilor flexor comun superficial al degetelor care sunt perforate la fața palmară a celei de a doua falange, de tendonul perforant corespunzător; 2. fiecare din cele 4 tendoane terminale ale mușchiului scurt flexor plantar, a căror dispoziție anatomică este similară celei ale tendoanelor perforate ale degetelor. |
| TENDON (LIGAMENT) ROTULIAN | ligament puternic întins între vârful rotulei și tuberozitatea anterioară a tibiei, format din prelungirea fibrelor tendinoase ale mușchiului cvadriceps. |
| TENOVAGINITĂ | termen arhaic utilizat pentru definirea inflamației simultane a unui tendon și a sinovialei vaginale care-i facilitează alunecarea. |
| TENECTOMIE | excizia totală sau parțială a unui tendon. |
| TENESME | (gr. <i>teinen – a întinde</i>), contracturi spastice dureroase ale sfincterului striat anal sau ale colului vezicii urinare. |
| TENIAZĂ | boală parazitară, determinată de prezența în intestinul omului a viermilor paraziți din genul <i>Taenia</i> . |
| TENIE | 1. vierme parazit care trăiește în intestinul subțire al omului; 2. structură în formă de bandă, de panglică. |
| TENIFUG | care provoacă expulzia teniei. |
| TENODEZĂ | 1. fixarea unui tendon rupt sau secționat, la locul său normal de inserție; 2. crearea unui nou punct de inserție osoasă pentru tendonul unui mușchi paralizat și secționat în acest scop. |
| TENODINIE | sin. tenalgie. |
| TENOLIZĂ | secționarea aderențelor constituite la nivelul unui tendon în scopul restabilirii mobilității sale. |
| TENON (CAPSULA LUI) | membrană formând o teacă fibroasă care învelește partea posterioară sclerală a globului ocular, de care e separată printr-un spațiu grăos spațiul Tenon; ea este perforată de nervul optic. |
| TENONIAN | care se referă la capsula lui Tenon. |
| TENONITĂ | inflamația capsulei lui Tenon. |
| TENOPEXIE | fixarea, în general prin sutură, a unui tendon de mușchiul corespunzător. |
| TENOPLASTIE | refacerea chirurgicală a unui tendon. |

| | |
|---|---|
| TENORAFIE | suturarea unui tendon secționat. |
| TENOSINOVITĂ | inflamarea unui tendon și a tecii sale sinoviale. |
| TENOTOMIE | secționarea chirurgicală a unui tendon. |
| TENOZITĂ | sin. tendinită. |
| TENSIOACTIV | se spune despre o substanță care, chiar într-o foarte slabă concentrație, scade tensiunea superficială a lichidului în care este dizolvată. |
| TENSIOMETRU | sin. sfigmomanometru. |
| TENSIUNE | 1. rezistența opusă de pereții cavitațiilor organice sau conducte față de lichidele sau gazele conținute; 2. tensiune electrică- diferență de potențial electric între două puncte; acestea se exprimă în volți. |
| TENSIUNE ARTERIALĂ | 1. într-un sens strict, tensiunea pereților arteriali corespunzătoare presiunii exercitată de sângele circulant; 2. prin extensie, sin. curent pentru presiune arterială. |
| TENSIUNE ARTERIALĂ RETINIANĂ | sin. presiune arterială oftalmică. abr. TAR. |
| TENSIUNE ARTERIALĂ SISTOLICĂ | abr. T.A.S. |
| TENSIUNE INTRAOCULARĂ | sin. presiune intraoculară. |
| TENSIUNE OSMOTICĂ | sin. presiune osmotică. |
| TENSOR | se spune despre un mușchi care determină tensionarea unei structuri anatomice, ex. mușchiul tensor al fasciei lata. |
| TENTACULE | organe subțiri, musculoase și senzitive, uneori ramificate, situate la cap sau în jurul gurii, la numeroase animale nevertebrate; servesc la explorare, condus și apucat hrana sau la fixare. |
| TENTACULATE | încrângătură (<i>Tentaculata</i> sau <i>Lophophorata</i>), de organisme protostomiene celomate, marine, cu gura înconjurată de un organ circular sau în formă de potcoavă – lofoforul – care poartă numeroase tentacule acoperite cu cili vibratili, cu nutriție de tip microfagic și mucociliar. |
| TEOBROMINĂ | derivat purinic xantinic, principalul alcaloid al bobului de cacao, conținut de asemeni în frunzele de tei, exercită o acțiune diuretică și cardi tonică și stimulează ușor sistemul nervos. |
| TEORIA CELULARĂ | a fost elaborată, în principal de M.J. Schleiden, T. Schwann (1838, 1839) și R.L.C. Virchow (1855) și considera că: celula este cel mai mic element de construcție, iar organismele au o alcătuire celulară sau pluricelulară; că fiecare celulă din organismul multicelular are o funcție specifică și că o celulă nu poate proveni decât din altă celulă. |
| TEPALĂ | element constitutiv al periantului (învelișului floral), nediferențiat prin formă și culori diferite în sepale (caliciu) și petale (corolă; ex. lălea, stânjenele, ceapă etc.). |
| TERAPEUT | medic care tratează bolnavul sau specialist care studiază diferitele metode de tratament. |
| TERAPEUTICĂ | 1. parte a medicinei care se ocupă cu tratamentul bolnavilor; 2. care interesează tratamentul bolnavilor, 3. care este susceptibil a vindeca o boală. |
| TERAPIE | tratament, ex. terapie de șoc. |
| TERAPIE GENICĂ | transferul unor gene sănătoase în celule purtătoare de gene patogene, cu scopul de a corecta anomaliile genetice, vectorii utilizați în prezent sunt retrovirusuri, care sunt puse în contact in vitro cu celulele prelevate de la bolnav. |

| | |
|--------------------------|--|
| TERATISM | monstruoziitate sau anomalie congenitală. |
| TERATOGEN | care produce monstruoziități; medicament care este absolut contraindicat femeilor însărcinate sau aflate în perioada fertilă, generează malformații. |
| TERATOLOGIE | (gr. <i>teras</i> – <i>monstru</i> ; <i>logos</i> - <i>studiu</i>), ramură a biologiei care studiază monstruoziitățile și malformațiile la plante și animale precum și cauzele lor în cursul dezvoltării ontogenetice. |
| TERATOM | tumoare congenitală cu țesuturi multiple, adesea chistică sau compusă dintr-o parte chistică și alta solidă. |
| TERATOID | care posedă unele caractere de monstruoziitate, ex. tumoră teratoidă. |
| TERATOPAG | monstru format din indivizi sudați la diverse nivele distingându-se: <i>cefalopagi</i> , când sunt uniți prin extremitatea cefalică, <i>pigopagi</i> , uniți prin regiunea lombrosacrată, <i>xiphopagi</i> , uniți prin regiunea xifoidiană, <i>toracopagi</i> , sudați unul de altul prin regiunea lor toracală, <i>sternopagi</i> , sudați numai prin regiunea sternală. |
| TERATOSPERMIE | ansamblu de anomalii ale spermatozoizilor susceptibile a produce efecte negative asupra oului și gestației. |
| TERATOZOOSPERMIE | creșterea numărului de spermatozoizi anormali. |
| TEREBRANT | care are tendința de pătrundere în profunzimea țesuturilor. |
| TERGUM | (lat. <i>tergum</i> - <i>spate</i>), porțiunea dorsală din cuticulă a fiecărui segment corporal la artropode. |
| TERMAL | se referă la apele minerale calde. |
| TERME | termen folosit altă dată pentru desemnarea unui stabiliment creat pentru folosirea în scop terapeutic a apelor termale. |
| TERMIC | care se referă la căldură (ex. conductibilitate termică) sau la temperatura corpului (ex. curbă termică). |
| TERMINAL | care se referă la extremitate; care constituie ultimul element, atât din punct de vedere al situației cât și din punct de vedere cronologic. |
| TERMINOLATERAL | se spune despre o anastomoză între extremitatea unui conduct și peretele lateral al segmentului care urmează. |
| TERMINOTERMIAL | se spune despre o anastomoză cap la cap a două segmente. |
| TERMITE | insecte, aparținând ordinului Isoptera, caracterizate prin mod de viață social și polimorfism accentuat al indivizilor. |
| TERMOANALGEZIE | abolirea sensibilității normale pentru căldură sau pierderea aptitudinii de a deosebi căldura de frig. |
| TERMOCAUTERIZARE | cauterizarea unei plăgi sau a unui țesut prin căldura produsă de un cauter încălzit. |
| TERMOCOAGULARE | coagularea unui țesut sub efectul căldurii produsă printr-un curent de înaltă frecvență. |
| TERMODOLORIMETRIE | metodă de evaluare a activității medicamentelor antalgice sau antiinflamatoare. |
| TERMOFIL | care preferă temperaturile ridicate; se spune despre microorganisme care trăiesc între 40-70 °C și care se dezvoltă mai bine între 50-55 °C. |
| TERMOGEN | care generează căldură, care se datorează căldurii. |
| TERMOGRAFIE | metodă de măsurare a temperaturii emise de țesuturi, cu ajutorul unui termograf care evaluează diferențele de temperatură a părților moi. |
| TERMOLABIL | care poate fi inactivat sau distrus prin încălzire. |
| TERMOLIZĂ | 1. pierderea căldurii unui organism; 2. descompunerea chimică cu ajutorul căldurii. |
| TERMOMETRIC | care se referă la măsurarea temperaturii. |

MIC DICȚIONAR BIO-MEDICAL

*Cristina R.T.,
Dumitrescu Eugenia,
Teușdea V.,
Boboloaca I.*

| | |
|---|--|
| TERMOMETRU | instrument de măsurare a temperaturii. |
| TERMORECEPTOR | organe de simț, care recepționează variațiile temperaturii din mediul exterior, situat în stratul dermic al pielii. |
| TERMOREGLARE | funcție a organismului care asigură echilibrul dintre termogenează și termoliză, pentru menținerea stării de homeotermie. |
| TERMOREZISTENT | care poate rezista la o temperatură crescută. |
| TERMOSTAT | aparat servind la menținerea unei temperaturi constante într-o etuvă, un sterilizator. |
| TERNAR | în chimie, care este compus din trei elemente. |
| TEROS | care este de culoarea pământului, ex. facies teros. |
| TERȚĂ (FEBRA) | febră intermitentă ale cărei accese se repetă la fiecare trei zile, este o formă particulară de paludism. |
| TERȚIAR | care vine pe al treilea loc. |
| TEST | orice procedeu care constituie o acțiune simplă sau o suită de operații destinate să pună în evidență caracteristicile unei substanțe, unui organism sau unei funcțiuni. |
| TEST CIS-TRANS | test genetic utilizat cu scopul de a stabili dacă două mutații genice au apărut în aceeași genă sau în gene adiacente. |
| TEST CROSS | retroîncrușișarea sau backcrossarea indivizilor dominanți (cu structură genetică necunoscută) cu părintele recesiv sau cu un tester recesiv, pentru a determina dacă indivizii respectivi sunt heterozigoți sau homozigoți pentru o alelă oarecare; testul cross se utilizează și în scopul evidențierii fenomenelor de linkage și crossing over, caz în care – di sau trihibridul F ₁ se încrușișează cu un tester dublu sau triplu recesiv. |
| TEST DE TOLERANȚĂ LA GLUCOZĂ | sin. hiperglicemie provocată. |
| TEST DE TRANSFORMARE LIMFOBLASTICĂ | test destinat decelării unei reacții de hipersensibilitate, are la bază faptul că dacă se pune o cultură de limfocite în contact cu un antigen la care au mai fost expuse, stimularea antigenică provoacă transformarea limfocitelor în limfoblaști. |
| TEST PSIHOLOGIC | orice probă implicând un scop bine definit de îndeplinit după o tehnică precisă, destinată evaluării inteligenței, comportamentului, caracteristicilor psihice sau a aptitudinilor unui individ. |
| TEST SEROLOGIC | cercetarea anticorpilor specifici unei boli într-o probă de ser sanguin. |
| TESTA (A) | a supune un subiect, un corp sau un fenomen la un test. |
| TESTICUL | glandă genitală masculină, pereche, situată sub penis, în bursa testiculară, înconjurat de o capsulă fibroasă numită albuginee, îngroșată în partea sa anterioară și superioară (corpul Higmore). |
| TESTICULARĂ (ARTERA) | arteră detașată din aorta abdominală care pătrunde pe traiectul ingvinal de unde urmează un traiect variat, distribuind o mulțime de colaterale parenchimului testicular. |
| TESTOSTERON | hormon steroid masculin secretat de celulele interstițiale ale testiculului și obținut de asemenea prin sinteză. stimulează dezvoltarea organelor sexuale masculine și imprimă caracterele sexuale secundare și favorizează sinteza de proteine în organism. |
| TESTUL APGAR | metodă de evaluare globală a stării copilului la naștere, bazată pe cercetarea celor mai caracteristice și ușor de decelat semne clinice, pentru stabilirea unui bilanț general, aceste semne reunite într-un tablou și notate după gradul de gravitate cu cifre (0, 1 sau 2) și cuprind: A, aspect (colorația), P, puls, G, grimasa, A, activitate (mobilitatea), R, respirația, un total de 10 puncte este considerat cel mai bun rezultat posibil. |
| TESTUL CU ACID HIPURIC | probă funcțională hepatică ce permite evaluarea capacității ficatului de a conjuga acidul bezoic cu glicocol, sub formă de acid hipuric, care se elimină prin urină. |

| | |
|--------------------------------------|---|
| TESTUL NELSON. | testul de imobilizare a treponemelor. |
| TESTUL DE POSTURĂ | explorarea funcțională a tensiunii arteriale constând în măsurarea acesteia în poziția culcat, apoi așezat și în picioare, la hipertensivi poziția în picioare antrenează creșterea tensiunii. |
| TESTUL CU FENOLSULFONFTALEINĂ | v. fenolsulfonftaleină. |
| TESTUL INELULUI | tehnică de cercetare calitativă in vitro a reacției de precipitare a anticorpilor în prezența antigenelor corespunzătoare, efectuată în mediu lichid. |
| TESTUL LA D-XYLOZĂ | test de determinare a stărilor de malabsorbție intestinală, în special la nivelul duodenului, constând în absorbția de către bolnav, a unei soluții de d-xyloză și apoi dozarea acestuia în sânge și urină. |
| TESTUL POSTCOITAL | sin. testul Huhner. |
| TESTUL ROZETELOR | v. imunoaderență. |
| TETAB | v. vaccin TeTAB. |
| TETANIC | 1. care se referă la tetanos, care are caracterele acestuia; 2. care este atins de tetanos. |
| TETANIE | stare de hiperexcitabilitate neuromusculară, trădată prin tulburări senzitive, motorii, trofice etc. |
| TETANIE HIPERPNEICĂ | v. sindromul de hiperventilație pulmonară. |
| TETANIE PARATIREOPRIVĂ | v. hipoparatiroidie. |
| TETANOID | asemănător convulsiilor tetanice. |
| TETANOS | boală infecțioasă acută provocată de bacilul tetanic. |
| TETRACICLINĂ | 1. antibiotic produs de o specie de <i>Streptomyces</i> și obținut prin sinteză, având un spectru larg de acțiune, eficace contra cocilor, bacililor gram pozitivi și gram negativi, rickettsiilor, spirochetelor și tolerat în general bine, se administrează pe cale orală; 2. nume general al unui grup de antibiotice cu structură chimică asemănătoare și al cărei reprezentant tipic este cel descris mai sus. |
| TETRACLORETIEN | lichid incolor, cu miros eterat, neinflamabil, întrebuințat ca dizolvant al unui mare număr de substanțe, vaporii săi sunt toxici. |
| TETRADĂ | grup de patru elemente. |
| TETRAHIDROCANABINOL | abr. T.H.C., drog halucinogen conținut în cannabis, |
| TETRAHIDRO-CORTICOSTERON | metabolit principal al corticosteronului, eliminat în cantități mici în urină. |
| TETRAHIDROCORTIZOL | sin. urocortizol, metabolit al cortizolului care se găsește în urină, |
| TETRAIODOTIRONINĂ | abr. T., sin. tiroxină. |
| TETRAMER | care este divizat în patru părți. |
| TETRANOPSIE | varietate de anopsie, interesând un sfert din câmpul vizual. |
| TETRAPLEGIE | paralizia mai mult sau mai puțin completă a celor 4 membre. |
| TETRAPLOIDIE | stadiul unei celule somatice care prezintă anomalia de a conține patru genomuri. |
| TETRAPODE | supraclasă de vertebrate care au patru membre; noțiune utilizată în sistematică pentru a indica clasele de vertebrate răspândite pe pământ: amfibieni, reptile, păsări și mamifere. |
| TETRASOMIE | stadiul unui organism diploid având în locul unuia din cromozomii pereche, patru cromozomi analogi, cu alte cuvinte având un cromozom reprezentat de patru ori. |
| TETRAZOM | formațiune alcătuită din 4 cromozomi omologi la unii aneuploizi; se simbolizează $2x+2$. |

| | |
|--------------------------------|---|
| TEZAURIZMOZĂ | denumire care înglobează un grup de boli dismetabolice, caracterizate prin depozitarea în celulele organismului a unor produși intermediari. |
| TEZAURISMOZĂ PULMONARĂ | maladie pulmonară rezultând din inhalarea unor aerosoli de lacuri. sin. maladia coaforului. |
| T.G.A. | abr. acceleratorul formării de tromboplastină (endogenă), factor de coagulare asociat betaglobulinelor prezent în sângele unor arteriosclerotici. |
| T.G.M.H. | abr. concentrația globulară medie în hemoglobină. |
| T.G.O. | abr. transaminaza glutamicoxalacetică. |
| T.G.P. | abr. transaminaza glutamopiruvică. |
| T.G.T. | abr. testul generării tromboplastinei. |
| Th. | simbolul chimic al thoriului. |
| T.H.C. | abr. tetrahidrocanabiol. |
| T.H.E. | abr. tetrahidrocortizon. |
| THEILERIOZĂ | boală parazitară, produsă de <i>Theileria dispar</i> și se manifestă prin febră, adenită etc. |
| THELALGIE | sensibilitate dureroasă a mamelonului. |
| THELITĂ | inflamația mamelonului. |
| THELODERMITĂ | 1. inflamația papilelor dermice; 2. inflamația mamelonului. |
| THELORAGIE | hemoragie la nivelul mamelonului. |
| T.H.F. | abr. tetrahidrocortizol. |
| THIERSCH | v. grefa Ollier-Thiersch. |
| THOMPSON (PROTEZA) | proteză în general cimentată, utilizată în tratamentul fracturilor de col femural la bătrâni. |
| THOMA (CAMERA) | tip de cameră de numărare a globulelor roșii, care se utilizează și pentru determinarea concentrației spermei în spermatozoizi, pe același principiu al metodei homocitometrice. |
| THORNER | acidometru pentru lapte. |
| T.I. | v. tomodensitometria. |
| TIAMINĂ | sin. aneurină, vitamina anti beri-beri, vitamină antineuritică, vitamină B ₁ ; vitamină din grupul B, conținând sulf și a cărei carență provoacă beri-beri. |
| TIBIA | os lung, cel mai voluminos din cele două oase care constituie scheletul gambei și care se află pe partea internă a acesteia. |
| TIBIO-NAVICULAR | care se referă la tibie și la scafoidul tarsului (os navicular). |
| TIBIO-PERONIER | care se referă la tibie și peroneu. |
| TIBIO-TARSIAN | care se referă la tibie și tars. |
| TIBIOTARSO-METATARSIANĂ | sin. articulația jaretului; complex articular ce leagă oasele gambei de oasele tarsiene, acestea între ele și oasele tarsiene la oasele metatarsiene, prezentând ligamente comune și ligamente proprii. |
| TIC | mișcare involuntară a unor grupuri musculare separate, care se produce repetat, are aspect intenționat și poate fi stăpânită prin voință. |
| TIEMIE | nivelul sulfului din sânge. |
| TIFFENEAU (RAPORTUL) | raportul între volumul expirator maximal pe secundă (VEMS) și capacitatea vitală (CV); este aproximativ 75. |

| | |
|----------------------------|--|
| TIFIC | <ol style="list-style-type: none"> 1. care se referă la tifosul exantematic; 2. care a contactat tifos exantematic; 3. care se referă la febra tifoidă; 4. caracterizat printr-o stare infecțioasă gravă. |
| TIFLECTOMIE | rezeecția cecului. |
| TIFOBACILOZĂ | formă gravă de generalizare a tuberculozei, cu producerea de leziuni granulare sau nodulare în numeroase organe și stare gravă de depresiune nervoasă. |
| TIFOIDĂ (FEBRA) | maladie infecțioasă febrilă, contagioasă, adesea epidemică cauzată de <i>Salmonella typhi</i> , transmisă direct de la bolnav sau de la purtător de germeni sau indirect (prin apă sau alimente contaminate). |
| TIFON | material fin și transparent, de in sau de bumbac, prezentat în ambalaje sterilizate, care se folosesc la pansarea plăgilor. |
| TIFOS | (gr. <i>typhos</i> – <i>amorțire, stupoare</i>), alterarea particulară a stării generale a bolnavilor în perioada de stare a anumitor boli infecțioase. |
| TIFOS AMARIL | sin. febră galbenă. |
| TIFOS EXANTEMATIC | sin. febră ataxică, exantematică, malignă, pătată epidemică, peteșială, tifos: epidemic, de lagăr, de păduche, de război, pătat; boală infecțioasă gravă acută și epidemică, provocată de <i>Rickettsia prowazeki</i> și care se manifestă prin febră mare și erupții pe piele. |
| TIFOS MURIN | maladie infecțioasă a șobolanului, cauzată de o rickettsie care poate fi transmisă ocazional omului prin paraziții animalului. |
| TIGNAFES | sindrom caracterizat prin respirație de tip abdominal; se produce mai frecvent din cauza insuficienței elasticității pulmonare. |
| TIJA PITUITARĂ | cordon de substanță nervoasă care unește infundibulumul tuberian cu lobul posterior al hipofizei. |
| TIMBRU TUBERCULINIC | v. percutireacția Moro. |
| TIMECTOMIE | ablația totală sau parțială a timusului. |
| TIMIC | <ol style="list-style-type: none"> 1. referitor la timus, 2. care se referă la dispoziția afectivă. |
| TIMIE | dispoziție, tonus, afectiv sau emoțional. |
| TIMINĂ | <ol style="list-style-type: none"> 1. bază pirimidinică prezentă în principal în acizii dezoxiribonucleici ai nucleului celular; 2. hormon produs de timus. |
| TIMOL | substanță fenolată extrasă din cimbru, întrebuințată ca reactiv, fungicid și agent de conservare a pieselor anatomice. |
| TIMOL (TESTUL) | sin. testul MacLagan. |
| TIMOLEPTIC | medicament cu acțiune tranchilizantă asupra tonusului emoțional perturbat (anxietate). |
| TIMOM | tumoră malignă sau benignă a timusului. |
| TIMP DE COAGULARE | timpul necesar sângelui plasat într-un tub la 37 °C pentru a se coagula. |
| TIMP DE LATENȚĂ | <ol style="list-style-type: none"> 1. într-o structură sensibilă, timpul care se scurge între primirea stimulului și răspuns; 2. timpul scurs între pătrunderea în organism a unui agent infecțios sau a unui alergen și prima manifestare, ca răspuns cauzal. |
| TIMP DE PROTROMBINĂ | v. metoda Quick. |
| TIMP DE SÂNGERARE | intervalul de timp scurs între apariția primei picături de sânge și ultima, ca urmare a unei incizii standard a lobului urechii. |
| TIMP DE SEDIMENTARE | sin. cu viteza de sedimentare. |

MIC DICȚIONAR BIO-MEDICAL

*Cristina R.T.,
Dumitrescu Eugenia,
Teușdea V.,
Boboloaca I.*

| | |
|------------------------|--|
| TIMPAN | <ol style="list-style-type: none">1. în limbaj curent, membrana timpanului,2. termen utilizat uneori pentru a desemna casa timpanului comparată cu o tobă dat fiind forma sa. |
| TIMPANAL | <ol style="list-style-type: none">1. os timpanal, piesă osoasă care împreună cu stânca și scoica constituie temporalul;2. care se referă la osul definit mai sus. |
| TIMPANIC | care se referă la timpan. |
| TIMPANISM | sonoritate particulară obținută la percuția unui organ destins de gaz și în special în cazul distensiei abdominale datorată prezenței de gaz sau aer în cantitate excesivă în intestin sau cavitatea peritoneală. |
| TIMPANITĂ | inflamația membranei timpanului (miringită) sau a casei timpanului. |
| TIMPANOMALEOLAR | care se referă la membrana timpanului și ciocănelului. |
| TIMPANOPLASTIE | orice operație reparatorie a membranei timpanale (miringoplastie) sau la nivelul casei timpanului. |
| TIMPANOSCLEROZĂ | prezența în urechea medie de țesut fibros cicatricial care formează aderențe, în special în jurul oaselor și ferestrelor labirintice și care poate provoca surditatea. |
| TIMUS | glandă endocrină situată în mediastinul antero-superior, care se dezvoltă continuu până la pubertate când ajunge la dimensiuni maxime (după aceea se atrofiază). |
| TINCTURĂ | soluție extractivă alcoolică sau eteroalcoolică obținută din produse de origine vegetală sau animală. |
| TINEA | <ol style="list-style-type: none">1. larvă, vierme;2. termen generic folosit în trecut pentru afecțiuni cutanate considerate a fi de natură micotică. |
| TIOGLUCOZIZI | principii existenți în unele plante și semințe care produc stări toxice grave la animale care le consumă. |
| TIOPEXIE | fixarea sulfului în țesuturi. |
| TIP | model ideal rezultat din grupajul unor caracteristici constante, alese după criterii diverse. |
| TIP ASTENIC | tip constituțional asemănător cu tipul respirator. |
| TIP CEREBRAL | tip constituțional caracterizat prin dezvoltarea mare a craniului și o slabă dezvoltare a corpului și în special a membrului. |
| TIP DIGESTIV | tip constituțional caracterizat prin torace scurt și larg, membre scurte și groase, corp larg și adânc, temperament liniștit, mișcări lente și capacitate mare de asimilare a hranei. |
| TIP EURISOMIC | tip constituțional, corespunzător tipului respirator. |
| TIP LEPTOSOMIC | tip constituțional, corespunzător tipului respirator. |
| TIP SĂLBATIC | genă care predomină într-o populație de tip sălbatic; se simbolizează cu + sau majusculă; schimbarea genei de tip sălbatic prin mutație a determinat apariția alelelor mutante. |
| TIPIC | <ol style="list-style-type: none">1. care prezintă principalele caracteristici ale unui tip dat, putând astfel servi de exemplu;2. se spune despre manifestările caracteristice unei maladii care facilitează diagnosticul. |
| TIRAJ | depresie care apare fie deasupra fie sub stern în timpul inspirațiilor puternice, în caz de obstacol în penetrarea aerului în pulmon. |
| TIRAMINĂ | amină biogenă rezultată prin decarboxilarea enzimatică a tirozinei; ca rol biochimic manifestă acțiune antagonistă față de histamină; are efect hipertensiv și stimulează contracția uterului. |
| TIREA | sinonim pentru glanda tiroidă. |
| TIREOGEN | care este de origine tiroidiană. |

| | |
|------------------------------------|--|
| TIROGLOBULINĂ | tiroglobulină. |
| TIROLIBERINĂ | hormon hipotalamic stimulator pentru secreția hipofizară de tirotropină. |
| TIROMEALIE | termen general definind hipertrofia tiroidei. |
| TIROPRIV | care rezultă din ablația chirurgicală sau din insuficiența funcțională a glandei tiroide. |
| TIROSARCOM | sarcom tiroidian. |
| TIROSTATIC | medicamente capabile de a diminua secreția hormonilor tiroidieni și susceptibili să atenueze simptomele datorate hipertiroidei. |
| TIROSTIMULINĂ | sin. tirotrofină. |
| TIROTOXIC | are efect toxic asupra glandei tiroide. |
| TIROTOXICOZĂ | sin. hiperdroidism; sindrom datorat excesului de hormoni tiroidieni la nivelul țesuturilor receptoare. |
| TIROTROP | care are afinitate pentru glanda tiroidă; care exercită o influență asupra tiroidei. |
| TIROTROPIN RELEASING FACTOR | abr. T.R.F., hormon secretat de hipotalamus care acționează ca factor declanșator al secreției de tirostimulină hipofizară. |
| TIROARITENOIDIAN | referitor la cartilajul tiroidei și cartilajul aritenoidian. |
| TIROCALCITONINĂ | abr. T.C.T., sin. calcitonină, |
| TIROFRENATOR | care încetinește secreția hormonilor tiroidieni. |
| TIROGEN | tirogen. |
| TIROGLOBULINĂ | proteină elaborată de glanda tiroidă care conține 95% din iodul tiroidian; dă, prin hidroliză, hormoni tiroidieni. |
| TIROHIOIDIAN | care se referă la cartilajul tiroid și osul hioid. |
| TIROID | cartilajul tiroid. |
| TIROIDĂ | glandă endocrină situată în fața traheei, formată din 2 lobi laterali uniți printr-un istm. |
| TIROIDECTOMIE | extirparea glandei tiroide. |
| TIROIDIAN | care se referă la tiroidă. |
| TIROIDISM | ansamblu de tulburări cauzate de administrarea de extracte tiroidiene în doze excesive. |
| TIROIDITĂ | inflamația glandei tiroide. |
| TIROIDOTERAPIE | tiroterapie. |
| TIRONINĂ | substanță chimică obținută din tiroxină prin îndepărtarea totală a iodului și care reprezintă produsul de bază din care derivă hormonii tiroidieni. |
| TIROPARATIROID-ECTOMIE | ablație chirurgicală totală sau parțială glandelor tiroide și paratiroide. |
| TIROTERAPIE | tratament cu extrase de glandă tiroidă. |
| TIROTOMIE | incizia cartilajului tiroidian pentru o intervenție pe laringe. |
| TIROTOXICOZĂ | sin. tireotxicoză. |
| TIOTRICINĂ | antibiotic izolat din culturile de <i>Bacillus brevis</i> , activ contra germenilor gram pozitivi, utilizat numai pe cale externă în infecții bucale, dentare, faringiene etc. |
| TIOTROFINĂ (DCI) | hormon secretat de lobul anterior al hipofizei care stimulează producerea hormonilor tiroidieni. |
| TIOTROPIN RELEASING FACTOR | abr. T.R.F., hormon secretat de hipotalamus, care acționează ca factor declanșant al secreției de tirotropină hipofizară, |

| | |
|--|--|
| TIROXINĂ | tetraiodotironină, hormon tiroidian provenind din tiroglobulină și care se obține de asemeni prin sinteză. |
| TIROZINĂ | acid aminat foarte răspândit în natură. |
| TIROZINEMIE | nivelul tirozinei în sânge. |
| TISULAR | referitor la țesuturi. |
| TIT | abr. testul de imobilizare a treponemelor. |
| TITRARE | operație prin care se precizează titrul unui produs infectat sau toxic. |
| TITRU | masă de substanță activă din unitatea de volum de soluție măsurată în g/mm ³ . |
| TIZANOPTERE | ordin (<i>Thysanoptera</i>) care cuprinde circa 1500 de specii de insecte mici, cu corpul turtit și alungit, înguste, prevăzute marginal cu perișori deși, fitofage sau prădătoare. |
| TIZANURE | ordin (<i>Thysanura</i>) de insecte apterigote, cu antene lungi, ochi compuși, corp mic și mijlociu, până la maxim 20 mm lungime, adaptate regiunilor calde și temperate, cu unele specii dăunătoare, în locuințe, bucătării (ex. <i>Lepisma saccharina</i> , <i>Thermobia domestica</i>). |
| T.M.N. | abr. tensiune arterială minimă. |
| T.M.X. | abr. tensiunea arterială maximă. |
| T.M.Y. | abr. Pentru tensiunea arterială medie. |
| T.N.M. (CLASIFICAREA) | sistem internațional de clasificare a tumorilor maligne bazat pe evoluția extensiei tumorale T, a invaziei ganglionare N și absența sau prezența metastazelor M. |
| TOCIT | care nu este ascuțit, care nu taie. |
| TOCOCARDIOGRAF | aparat care înregistrează simultan, în timpul nașterii, bătăile inimii fătului și contracțiile uterine. |
| TOCOCARDIOGRAFIE | sin. cardiocografie. |
| TOCODINAMOMETRU | instrument pentru determinarea forței contracțiilor uterine în timpul travaliului. |
| TOCOFEROL | v. vitamina E. |
| TOCOGRAFIE | înregistrarea forței contracțiilor uterului în timpul travaliului cu ajutorul tocometrului. |
| TOCOMETRU | sin. tocodinamometru. |
| TOFUS | conglomerat uratic vizibil sub pielea gutoșilor, mai ales la urechi, coate, picioare, mâini. |
| T.O.G. | abr. transaminaza glutamo-oxaloacetică. |
| TOLBUTAMIDĂ (PROBA) | probă de laborator care constă în provocarea unei hipoglicemii prin injecția i.v. a 1g tolbutamină (sulfamidă cu efect hipoglicemiant). |
| TOLERANȚĂ | facultatea organismului viu de a suporta fără daune aparente efectele chimice sau fizice la care este expus. |
| TOLERANȚĂ LA GLUCOZĂ | v. hiperglicemie provocată. |
| TOLERANȚĂ IMUNOLOGICĂ | incapacitatea de anticorpoformare față de un substrat antigenic, la care obișnuit indivizii speciei respective răspund prin formarea de anticorpi. |
| TOMOCONTRASTO-GRAFIE ABDOMINALĂ | metodă de radiografie a peretelui vezicular prin perfuzia rapidă a 100-125 ml/min din 150 ml de substanță de contrast diluată în 150 ml glucoză 5%. |
| TOMODENSIMETRIE | metodă de diagnostic prin radiații X, utilizând aplicațiile moderne ale electronicii și tehnicii informaticii Rx pentru țesuturi, tomodensitometria este de 500-800 ori mai sensibilă decât sistemul fotografic, putând înregistra diferențele de densitate între, de exemplu, substanța cenușie și albă a creierului sau între cristalin și corpul vitros al globului ocular. |
| TOMODENSITOMETRU | termen întrebuințat mai des în Franța pentru a desemna aparatul cu ajutorul căruia pot fi obținute prin metoda tomodensitometriei imagini ale țesuturilor. |

MIC DICȚIONAR BIO-MEDICAL

*Cristina R.T.,
Dumitrescu Eugenia,
Teușdea V.,
Boboloaca I.*

| | |
|----------------------------------|---|
| TOMOGRAFIE | examen radiologic executat cu ajutorul tomografului, prin care se realizează imagini radiografice ale secțiunilor unui organ. |
| TOMODENSIOMETRIE. | abr. T.A.C. sau T.A.I., tomografie axială informatizată, |
| TOMOGRAFIE DE EMISIE | metodă de diagnostic care oferă o imagine în felii de țesut impregnat în prealabil cu un produs marcat, administrat în general intravenos. |
| TOMOGRAFIE INFORMATIZATĂ | abr. T.I. sau TC.v. tomodensiometrie. |
| TOMOGRAFIE RECONSTRUCTIVĂ | v. tomodensiometrie. |
| TOMOLOGIE | termen introdus de Jan de Winter pentru a grupa toate disciplinele care au tangență cu studiul secțiunilor corpului uman. |
| TOMOMETRIE | v. tomodensiometrie. |
| TONIC | <ol style="list-style-type: none">1. care se referă la tonusul muscular;2. care stimulează și fortifică organismului,3. contractură musculară prelungită, provocată de o convulsie care produce o stare de rigiditate, de contractură continuă. |
| TONICARDIACE | substanțe folosite cu scopul corectării insuficienței cardiace. |
| TONICITATE | calitatea mușchilor sau a țesuturilor de a fi permanent elastice. |
| TONICOCLONIC | contracturi musculare care sunt în același timp clonice și tonice. |
| TONOMETRU | instrument pentru determinarea obiectivă și precisă a tensiunii oculare. |
| TONOPLAST | membrană care mărginește o vacuolă. |
| TONOSCOPIE | sin. oftalmodinamometrie. |
| TONSILAR | sin. amigdalian. |
| TONSILECTOMIE | sin. amigdalectomie. |
| TONSILITĂ | sin. amigdalită. |
| TONUS MUSCULAR | stare de tensiune ușoară dar permanentă existentă în mod normal la nivel muscular. |
| TONUS UTERIN | starea de contracție a fibrelor musculare uterine netede, în intervalul dintre două contracții succesive, care ajută la menținerea poziției câștigate în timpul contracției uterine. |
| TOPECTOMIE | rezeecția unor zone bine determinate și localizate ale scoarței cerebrale. |
| TOPIC | medicament de uz extern cu acțiune locală în locul în care este aplicat. |
| TOPOGRAFIE | studiul sau descrierea structurilor unei regiuni determinate a corpului și a rapoartelor lor. |
| TORACALGIE | durere toracică. |
| TORACE | porțiunea trunchiului situată deasupra diafragmului și dedesubtul gâtului. |
| TORACE ÎN CARENĂ | torace aplatizat lateral, cu un stern proeminent. |
| TORACE ÎN PÂLNIE | deformație congenitală sau căpătată a toracelui, constând într-o depresiune a părții inferioare a sternului. |
| TORACE DE PORUMBEL | asocierea unei proeminențe înalte a sternului cu aplatizarea laterală a arcurilor anterioare. |
| TORACIC | care se referă la torace. |
| TORACOCENTEZĂ | puncția peretelui toracic în scop explorator sau de a evacua lichid din cavitatea pleurală. |
| TORACODEL | monstru dublu, monocefalian, cu trunchiurile reunite în jumătatea cefalică a corpului, începând din zona mezogastrică preombilicală. |
| TORACODINIE | sin. toracalgie. |

MIC DICȚIONAR BIO-MEDICAL

*Cristina R.T.,
Dumitrescu Eugenia,
Teușdea V.,
Boboloaca I.*

| | |
|----------------------------------|---|
| TORACODYM | monstru dublu, sudat de la torace spre zona pelvină. |
| TORACOFRENOTOMIE | incizia peretelui toracic și a diafragmei. |
| TORACOPLASTIE | rezecția parțială sau totală a mai multor coaste pentru colabarea pulmonului prin rețracția peretelui toracic. |
| TORACOPNEUMOTOMIE | deschiderea cutiei toracice prin rezecție costală și incizia parenchimului pulmonar pentru scoaterea unui corp străin sau drenarea unui abces. |
| TORACOXIPHOPAG | monstru dublu, monocefalian, sudat la nivelul sternului prezentând comunicarea sacilor pericardici, dar ficat unic. |
| TORACOTOMIE | deschiderea chirurgicală a peretelui toracic. |
| TORCH | v. sindromul TORCH. |
| TORIU | element radioactiv care generează o serie de elemente radioactive intermediare, ca toriu; oxidul de toriu este utilizat în radiologia digestivă în locul bariului. |
| TORPID | se spune despre leziuni care evoluează foarte încete manifestând doar slabă tendință spre ameliorare sau agravare. |
| TORPOARE | stare de amorțire generală fizică și psihică însoțită cel mai des de momente de ațipire. |
| TORR | unitate de presiune egală cu a 760-a parte din atmosfera normală. |
| TORSADA VÂRFULUI | formă de fibrilație ventriculară caracterizată la E.C.G. printr-un complex Q.R.S. cu axă care se schimbă progresiv, astfel că, în unele derivații, complexul ventricular pare că se rotește în jurul liniei izoelectrice, clinic se traduce prin sincopă brutale repetate care pot fi foarte grave. |
| TORSIUNE (TORSIONARE) | 1. stare de răsucire; 2. mișcare conjugată a globilor oculari care se exercită în jurul axei anteroposterioarea ochiului. |
| TORSIUNE TESTICULARĂ | sin. torsiunea cordonului spermatic; accident acut dureros produs prin răsucirea cordonului spermatic în jurul său, provocând o ischemie testiculară. |
| TORTICOLIS | (lat. <i>tortum collum – gât răsucit</i>), răsucirea gâtului cu înclinarea capului însoțită de dureri musculare. |
| TORTICOLIS CONGENITAL | torticolis permanent care se datorează rețracției congenitale a mușchiului sternocleidomastoidian sau a unei lezări a acestui mușchi în timpul nașterii. |
| TORULOPSIS NEOFORMAS | denumire veche pentru o serie întregă de levuri și ciuperci levuriforme. |
| TORULOZĂ | sin. criptococoză. |
| TOWNE (INCIDENȚA) | incidență sagitală frontooccipitală oblică pentru radiografia craniului care pune în evidență scoica occipitalului, fosele occipitale și marginea anterioară a găurii occipitale. |
| TOXALBUMINE | principii existenți în unele plante și semințe, care produc stări toxice la animalele care le consumă. |
| TOXEMIE | prezența în sânge a unor toxine de origine exogenă sau endogenă. |
| TOXEMIE GRAVIDICĂ TARDIVĂ | sin. disgravidie. |
| TOXICITATE | calitatea unei substanțe care poate intoxica organismul. |
| TOXICODERMIE (TOXIDERMIE) | dermatoză de origine toxicoalergică, în particular de origine medicamentoasă. |
| TOXICOGEN (TOXIGEN) | care produce o substanță toxică. |
| TOXICHEMIE | sin. toxemie. |
| TOXICOLOGIE | știința care se ocupă cu studiul otrăvurilor, efectul lor, mijloacele de decelare, efectele morbide produse și remediile de combatere. |
| TOXICOMAN | care prezintă o toxicomanie. |

| | |
|-------------------------------|--|
| TOXICOMANIE | stare de intoxicare periodică sau cronică generată de consumarea repetată a unui drog și care se însoțește de dorința irezistibilă sau de o necesitate de a continua consumul de drog și de a-l procura prin orice mijloace, cu tendința de a crește doza și dependența psihică și, uneori, fizică față de drog. |
| TOXICOZĂ | tulburare gravă de nutriție la sugari, manifestată prin diaree, vomă etc. |
| TOXICOZĂ GRAVIDICĂ | ansamblu de tulburări care survin de obicei în ultimele trei luni de gestație, cu predominanța unor manifestări vasculare și renale. |
| TOXIGEN | care produce toxine; cu referire mai ales la microorganisme. |
| TOXIINFECȚIE | stare de intoxicare a organismului cauzată de substanțe toxice secretate de unele microorganisme. |
| TOXINĂ | substanță organică cu acțiune toxică, produsă de organisme vegetale sau animale. |
| TOXINIC | cu referire la toxine; care este provocată de toxine. |
| TOXINOTERAPIE | terapeutică bazată pe utilizarea toxinelor. |
| TOXOCARA | gen de paraziți intestinali din familia <i>Ascaridae</i> , clasa <i>Nematoda</i> . |
| TOXOGEN | toxigen. |
| TOXOID | sin. anatoxină. |
| TOXOPLASMA | protozoar parazit unicelular fără pigment, care se întâlnește în leucocitele vertebratelor și uneori în hematii. |
| TOXOPLASMOZĂ | boală parazitară congenitală sau dobândită, determinată de protozoare din genul <i>Toxoplasma</i> . |
| TOXOPLASMOZĂ PULMONARĂ | reacție inflamatorie a țesutului pulmonar cu focare sau plaje întinse de necroză, datorate formei diseminate a infecției cu <i>Toxoplasma gondii</i> . |
| T.P. | abr. timp de protrombină. |
| T.P.I. | abr. test Nelson. |
| T.R. | abr. tușeu rectal. |
| TRABECUL CORNEOSCLERAL | mică zonă de condensare tisulară sub formă de mici striții, situată la periferia corneei. |
| TRABECULAR | care este format din mici travee, în general reunite într-o rețea. |
| TRABECULARE | ansamblu de structuri mai mult sau mai puțin liniare, aliniate sau încrucișate, interesând mai ales țesutul pulmonar sau osos și peretele vezicii. |
| TRACT | 1. în anatomie, fascicul de fibre nervoase sau musculare; 2. ansamblu de conducte și viscere aparținând sistemului anatomo-fiziologic. |
| TRACT UVEAL | tunică medie vasculară a ochiului care cuprinde coroida, corpul ciliar și irisul. |
| TRACȚIUNE | acțiunea de a trage. |
| TRADUCERE GENETICĂ | proces prin care mesajul genetic purtat de acidul ribonucleic mesager este tradus într-o secvență specifică de acizi aminați în cadrul sintezei unei proteine determinate. |
| TRAGUS | proeminență aplatizată și triunghiulară situată pe fața externă a pavilionului urechii, având posterior conca și inferior helixul, se proiectează ca un opercul înainte și în afara orificiului conductului auditiv extern. |
| TRAHEE | tub cartilagos și membranos întins de la extremitatea inferioară a laringelui până la împărțirea sa în cele 2 bronhii pulmonare. |
| TRAHEIDE | vase lemnoase formate, de regulă, dintr-o singură celulă îngustă și ușor alungită; pereții sunt îngroșați și lignificați, iar la capete aceștia au punctuațiuni care fac ca apa să circule mai încet comparativ cu viteza de circulație în trahee. |
| TRAHEITĂ | inflamație acută sau cronică a traheei. |

| | |
|--------------------------------|---|
| TRAHELHEMATOM | hematom al gâtului format uneori în teaca sternocleidomastoidianului, la nou născut, ca urmare a unui traumatism în timpul travaliului. |
| TRAHELISM | contractură spasmodică a mușchilor gâtului care se produce în unele crize de epilepsie, provocând jenă respiratorie și circulatorie. |
| TRAHELOPEXIE | sin. cervicopexie. |
| TRAHELOPLASTIE | intervenție chirurgicală practică efectuată pe colul uterin pentru a-i da o morfologie și situație normale. |
| TRAHELORAFIE | repararea rupturilor colului uterin. |
| TRAHEOBRONȘITĂ | inflamația simultană a traheei și bronhiilor. |
| TRAHEOLĂ | element de constituție al sistemului traheal la insecte. |
| TRAHEOMALACIE | ramolimentul cartilajelor traheei. |
| TRAHEOMALACIE ESENȚIALĂ | creșterea complianței traheei, generalizată sau localizată, primitivă și secundară, radiologic se traduce prin diminuarea diametrului anteroposterior traheei, în timp ce diametrul transversal poate rămâne normal. |
| TRAHEOPLASTIE | operație cu scopul de a reface printr-o grefă, de obicei cutanată, o trahee mutilată printr-o pierdere de substanță. |
| TRAHEORAFIE | sutura chirurgicală a traheei. |
| TRAHEOSCOPIE | explorarea vizuală cu ajutorul bronhoscopului care se introduce prin gură sau printr-un orificiu practicat în trahee. |
| TRAHEOSTENOZĂ | strâmtorarea traheei. |
| TRAHEOSTOMIE | operație prin care traheea este fixată la piele după ce i s-a practicat un orificiu, pentru asigurarea respirației permanente pe această cale. |
| TRAHEOTOMIE | incizia peretelui anterior al traheei, practică în cazul unui obstacol la nivelul faringelui sau laringelui și care împiedică pătrunderea aerului în plămâni. |
| TRAHEOTOMIZAT | subiect care a suferit o traheotomie. |
| TRAHOM | conjunctivită granuloasă. |
| TRAINNING AUTOGEN | neologism englez însemnând antrenament autogen; metodă de relaxare musculară prin sugestie vizând o concentrare asupra eului pentru reprezentarea imaginii corpului. |
| TRANCHILIZANT | medicament care reduce starea de presiune psihică și determină o stare de calmare, de indiferență. |
| TRANSAMINARE | v. transaminază. |
| TRANSAMINAZĂ | orice enzimă care activează transferul grupurilor aminate ale acizilor aminați pe acizi cetoni sau aldehide, jucând astfel un rol în degradarea proteinelor și în sinteza glucozei plecând de la substanțe nonglucidice. |
| TRANSCONDILIAN | care trece de-a latul unui condil. |
| TRANSCRIȚIE GENETICĂ | sinteza unui lanț de A.R.N. care copiază mesajul cuprins într-un lanț de A.D.N. |
| TRANSDUCȚIE | proces prin care bacteriofagii temperați realizează transferul de informație genetică de la o bacterie donator la o bacterie receptor. |
| TRANSFER | <ol style="list-style-type: none"> 1. în psihanaliză, mecanism prin care un subiect, în cursul tratamentului, raportează asupra psihanalistului sentimentele de afecțiune sau ostilitate încercate în copilărie mai ales pentru părinți sau apropiați; 2. prin extensie, acțiunea de raportare a propriilor emoții, sentimente ori intenții asupra unei alte persoane iubite sau urâte. |

| | |
|-------------------------------|--|
| TRANSFERAZĂ | orice enzimă care transferă o parte de moleculă, un radical de la un donator la un acceptor. |
| TRANSFERINĂ | beta-2-globulină prezentă în plasma sanguină în cantitate mică și capabilă să fixeze fierul în mod reversibil și să îl transporte la măduva osoasă. sin. siderofilină. |
| TRANSFIXIANT | care traversează dintr-o parte în alta. |
| TRANSFORMARE | în genetică, schimbare indusă prin incorporarea într-o celulă receptor a unui A.D.N. purificat, diferit structural, denumit A.D.N.T. (transformator) provenit de la un alt organism; fenomenul transformării a fost descoperit la bacterii. |
| TRANSFUZAT | care a primit o transfuzie. |
| TRANSFUZIE | <ol style="list-style-type: none"> 1. injectarea intravenoasă de sânge compatibil, proaspăt sau conservat; 2. prin extensie, injectarea în vasele sanguine a unui constituent al sângelui sau a unui succedaneu. |
| TRANSFUZIE AUTOLOGĂ | sin. autotransfuzie. |
| TRANSFUZIE TOTALĂ | sin. exsanguinotransfuzie. |
| TRANSGRESIE | apariția în generațiile segregate a unor fenotipuri extreme sau segreganți transgresivi, care depășesc expresia maximală sau minimală a unei caracteristici comparativ cu nivelul manifestării caracteristicii respective la părinții originali. |
| TRANSHIDROGENAZĂ | enzimă care activează o reacție de transfer de hidrogen. |
| TRANSILUMINARE | sin. diafanoscopie. |
| TRANSLAȚIE | procesul prin care informația genetică transcrisă din ADN în molecula de <i>m</i> ARN trece în citoplasmă unde, după ce se asociază cu ribozomii, specifică secvența de aminoacizi în noile proteine. |
| TRANSLOCAȚIE | <ol style="list-style-type: none"> 1. intervenție chirurgicală constând din modificarea traiectului unui tendon pentru a-i conferi o funcție diferită; 2. aberație cromozomială caracterizată prin deplasarea unuia sau mai multor segmente cromozomiale fie pe același cromozom fie prin schimb reciproc intercromozomal de fragmente detașate între doi cromozomi omologi sau neomologi. |
| TRANSMEZOCOLIC | care traversează mezocolonul. |
| TRANSMISIBIL | se spune despre o maladie contagioasă care poate fi transmisă unui individ de la alt individ fie direct, fie indirect. |
| TRANSMURAL | se spune despre o leziune care interesează miocardul în toată întinderea sa. |
| TRANSMUTAȚIE | transformarea spontană sau provocată a unui corp simplu într-un alt corp. |
| TRANSORBITAR | care traversează orbita; care se efectuează traversând orbita. |
| TRANSPEPTIDAZĂ | sin. transferază. |
| TRANSPERITONEAL | care traversează peritoneul. |
| TRANSPIRAȚIE | excreție a sudorii produsă de glandele sudoripare. |
| TRANSPLACENTAR | care trece prin placentă în circulația fetală, care se transmite prin intermediul placentei, ex. infecție transplacentară. |
| TRANSPLANT | grefon sau organ transplantat. |
| TRANSPLANTARE | orice grefă și în special grefă de organ de la o persoană la alta care implică restabilirea continuității vaselor sanguine. |
| TRANSPLEURAL | care traversează pleura. |
| TRANSPOZIȚIE VISCERALĂ | sin. situs inversus. |

| | |
|----------------------------------|---|
| TRANSUDARE | trecerea lichidului provenind din plasmă prin peretele vascular anatomic intact într-o cavitate seroasă sau în spațiul interstițial adiacent ca urmare a unei staze circulatorii venoase su limfatice. |
| TRANSUDAT | lichid organic, de origine plasmatică, acumulat prin transudare într-o cavitate seroasă sau în spațiile interstițiale în care de obicei nu este prezent, transudatul nu conține niciodată fibrinogen și se deosebește de exudat prin conținutul slab în albumină. |
| TRANSUDAT PLEURAL | sin. hidrotorax. |
| TRANSURETRAL | care traversează uretra. |
| TRANSVAGINAL | intervenție chirurgicală practică prin vagin. ex. celioscopie transvaginală. |
| TRANSVERS | care are o poziție perpendiculară pe axei longitudinale a corpului sau axei mari a unui organ. |
| TRANSVERSECTOMIE | rezecția apofizei transverse a unei vertebre. |
| TRANSVERSIE | înlocuirea unei baze purinice într-o catenă de A.D.N. sau A.R.N. de către o bază pirimidinică și a unei pirimidine de către o purină. Transversia ca și tranziția determină o copie greșită a informației genetice fapt care determină apariția mutațiilor. |
| TRANSVERSOCOSTAL | sin. costotransversal. |
| TRANZIT | pasajul alimentelor prin tubul digestiv. |
| TRANZIȚIE | înlocuirea unei baze purinice într-o catenă de A.D.N. sau A.R.N. cu o altă bază purinică sau a unei pirimidine cu altă pirimidină. |
| TRANZIT BARITAT | examen radiologic al tubului digestiv după absorbția unui produs de contrast. |
| TRAPAJ PULMONAR EXPIRATOR | absența umbrei radiologice a unuia sau două câmpuri pulmonare în timpul expirării și care exprimă prezența unei bronhopatii obstructive. |
| TRAPEZ | <ol style="list-style-type: none">1. osul cel mai lateral și distal al carpului;2. mușchiul trapez. |
| TRAPEZOID | <ol style="list-style-type: none">1. care seamănă cu un trapez;2. os al șirului distal al oaselor carpiene interpus între trapez în afară și osul mare intern. |
| TRAPEZOSCAFOIDIAN | care se referă la trapez și scafoid. |
| TRASOR | substanță care, introdusă în organism sau într-un produs organic, poate fi ușor identificată datorită unor proprietăți particulare și din această cauză este folosită în explorări funcționale precise și localizări morfologice. |
| TRATAMENT | ansamblu de mijloace chimice, fizice, biologice și psihice, întrebuințate pentru vindecarea, ameliorarea sau scurtarea unei boli. |
| TRATAMENT CONSERVATOR | tratament care vizează menținerea funcțiilor fiziologice într-o stare relativ satisfăcătoare atunci când nu este absolut indispensabil sau când nu este posibil de a ataca chiar cauzele răului. |
| TRATAMENT INTENSIV | sin. îngrijiri intensive. |
| TRAUMATIC | care se referă la o traumă sau la un traumatism. |
| TRAUMATISM | ansamblul tulburărilor de ordin local și general care apar consecutiv acțiunii unui agent vulnerant asupra organismului. |
| TRAUMATIZAT | care a suferit un traumatism. |
| TRAUMATOGEN | <ol style="list-style-type: none">1. care se referă la un traumatism;2. care este susceptibil să provoace un traumatism. |
| TRAUMATOLOGIE | medicina accidentelor. |
| TRAUMĂ | leziune produsă local printr-o acțiune exterioară violentă. |

| | |
|------------------------------------|---|
| TRAVALIU | 1. totalitatea fenomenelor mecanice, plastice și dureroase care se produc în timpul nașterii și care concură la expulzia fătului; 2. lucru mecanic. 3. angrenaj pentru conrenție. |
| TRAVEE OSOASE | structură liniară foarte fină a osului spongios care întărește stabilitatea osoasă a osului compact. |
| TRAVESTISM | tendința de a adopta îmbrăcămintea și obiceiurile sociale ale sexului opus. |
| TREFIN | fierăstrău circular adaptat la un trepan servind la decuparea unui disc în peretele cranian sau perforator central al unui fierăstrău circular. |
| TREFINARE | termen întrebuințat mai ales de chirurgii de limbă engleză, sinonim cu trepanație. |
| TREITZ (FASCIA) | fascie care unește în spate duodenul, pancreasul și fața posterioară a mezoduodenului cu peritoneul parietal. |
| TREITZ (HERNIA) | hernie retroperitoneală a unei anse intestinale prin hiatusul Winslow. |
| TREMATODA | (gr. <i>trematodes</i> – <i>găurit, ciuruit</i>), clasă de viermi paraziți din subîncrengătura <i>Plathelminthes</i> ; se caracterizează prin existența pe corp a unor orificii și ventuze pentru fixare; sunt paraziți interni, anaerobi. |
| TREMOR | mișcare ușoară, involuntară, repetată, de obicei rapidă, a corpului sau a unei părți a lui. |
| TREMOR DE ACȚIUNE (CINETIC) | tremurat care se produce în cursul unui act, al unei mișcări active. |
| TREMOR DE ATITUDINE | tremurat care apare în cazul menținerii voluntare a unei atitudini și care interesează în special membrele superioare; dispare în repaus când musculatura este relaxată. |
| TREMOR DE REPAUS (STATIC) | tremurături care apar în repaus și dispar în timpul mișcărilor. |
| TREMOR PARKINSONIAN | tremurăturile din boala Parkinson, cu oscilații lente și regulate care survin în general în repaus și care afectează un membru în întregime, adeseori buzele, mandibula și limba. |
| TREMURĂTURĂ | suită de oscilații ritmice, involuntare, ale unei părți a organismului sau ale corpului în întregime. |
| TRENDELENBURG (POZIȚIA) | poziție culcat pe spate, cu bazinul ridicat în raport cu umerii și capul. |
| TRENDELENBURG (SEMNU) | deplasarea umerilor spre partea bolnavă în timpul mersului sau sprijiniți pe membrul afectat, în cazul unei luxații congenitale a șoldului. |
| TREPAN | instrument pentru perforarea osului, în special a craniului. |
| TREPANAȚIE | operație care constă în practicarea unei deschideri într-un os, în special în craniu, în general cu ajutorul unui trepan. |
| TREPIED FEMURAL | ansamblu format în triunchiul Scarpa de artera femurală comună și cele două ramuri ale sale. |
| TREPIDANT | care este obiectul unei trepidații. |
| TREPIDAȚIE | tremurătură patologică, în secuse marcate și rapide. |
| TREPIDAȚIE EPILEPTOIDĂ | sin. clonus. |
| TREPONEMA PALLIDUM | gen de bacterii din familia <i>Treponematoceae</i> , clasa <i>Schizomycetes</i> ; agentul etiologic al infecției sifilitice la om. |
| T.R.F. | abr. thyreotropin releasing factor. |
| T.R.H. | abr. thyreotropin releasing hormone. |
| TRIADĂ | 1. grup de trei semne, simptome sau elemente de diagnostic, 2. orice grup de trei elemente cu o legătură comună. |

| | |
|---------------------------------|--|
| TRIAMCINOLON | corticosteroid de sinteză cu acțiune antiinflamatorie și antialergică foarte puternică, cu indicații asemănătoare cortizonului, administrat pe cale orală sau sub formă de pomadă. |
| TRIBADĂ | sin. lesbiană. |
| TRIBULOZĂ | fotodermatoză produsă prin consumarea de plante din genul <i>Tribulus</i> . |
| TRICEPS | 1. se spune despre un mușchi care se înserează la o extremitate prin trei capete distincte; 2. mușchiul triceps (brahial sau sural). |
| TRICHIASIS | deviație congenitală sau căpătată a cililor înăuntru spre globul ocular, pleoapa păstrându-și poziția sa normală. |
| TRICHINELLA (TRICHINA) | gen de viermi paraziți din familia <i>Trichinellides</i> , clasa <i>Nematoda</i> ; foarte întâlniți la porc; provoacă la om trichineloză (sin. trichinoză) prin consumare de carne de porc infestată; pentru evitare se recomandă fierberea sau frigerea îndelungată a cărnii. |
| TRICHINELOZĂ | maladie parazitara datorată lui <i>Trichiella spiralis</i> introdusă în organism prin ingestia de carne de porc sau cal infestată, insuficient fiartă sau friptă și care conține larve închistate. |
| TRICHINOSCOPIE | depistarea cu ajutorul examenului microscopic a trichinei în porțiunile de carne de porc special recoltate în acest scop din diafragmă, mușchi intercostali etc. |
| TRICHOBEZOAR | (gr. <i>thrix- păr</i>), bezoar format prin împâslirea sub formă de minge a produțiilor piloase, observat la animalele care se ling sau prezintă pică. |
| TRICHOMONAS | gen de protozoar flagelat din familia <i>Trichomonadidae</i> , clasa <i>Flagellata</i> . |
| TRICHOMONAS INTESTINALIS | specie de <i>Trichomonas</i> care trăiește de obicei în intestinul gros al omului. |
| TRICHOMONAS VAGINALIS | gen de protozoar flagelat; se localizează pe mucoasa vaginală la femeie, mai rar în șanțul balano-prepuțial la bărbat; determină tricomonaza genitală. |
| TRICHOPHYTON | gen de dermatofit cuprinzând numeroase specii și varietăți parazite la om și animale, agent al tricofitiei. |
| TRICHOREXIS NODOSA | afecțiune frecventă a bărbii la bărbat, a părului capului și a pubisului la femeie, caracterizată prin nodozități albe în lungul firelor de păr, datorate unor despicări a fibrelor părului. |
| TRICHURIS TRICHIURA | numele științific al viermelui tricocefal. |
| TRICIPITAL | care se referă la mușchiul triceps. |
| TRICLORETILEN | lichid volatil, cu miros caracteristic, asemănător cu cel al cloroformului, este un solvent pentru rășini, ceară, lacuri și cauciuc. |
| TRICOCEFAL | vierme nematod lung de 30-50 mm, cu extremitatea anterioară efilată, care trăiește de obicei în cec și apendicele omului, rar în intestinul subțire. |
| TRICOCLAZIE | fragilitate anormală a firului de păr. |
| TRICOEPITELIOM | tumoră bine delimitată conținând chiști cheratinizați formată din structuri pilare și extensii epiteliale. |
| TRICOFIȚIE | micoză provocată de un dermatofit din genul <i>Trichophyton</i> . |
| TRICOFOLICULOM | tumoră pilară benignă, chistică, cuprinzând foliculi piloși abortivi, în general unică, localizată la față. |
| TRICOID | asemănător unui fir de păr. |
| TRICOMANIE | sin. tricotilomanie. |
| TRICOMI | peri sau solzi crescuți pe epiderma unei plante; tal filamentos la algele albastre. |
| TRICOMICINĂ | antibiotic administrat pe cale orală sau locală în tratamentul afecțiunilor genitourinare cu <i>Trichomonas</i> . |
| TRICOMICOZĂ | nume generic pentru micozele firului de păr. |
| TRICOMONAZĂ | boală determinată de paraziții <i>Trichomonas</i> . |
| TRICOPATIE | sin. tricoză. |

| | |
|------------------------|--|
| TRICOPTERE | ordin (<i>Trichoptera</i>) de insecte friganide cu aripi membranoase, cu peri mici, asemănătoare fluturilor, cu larve acvatice, dintre care unele construiesc tuburi (din diferite materiale: particule de nisip, ace de conifere, resturi vegetale etc.) pentru adăpost și prinderea hranei. |
| TRICOPTILOZĂ | alterație a firului de păr, care se usucă, devenind casant. |
| TRICOSIS | apariția firelor de păr acolo unde în mod normal nu există. |
| TRICOTILOMANIE | tic constând în a smulge mereu fire de păr, indiferent de regiune. |
| TRICOZĂ | orice afecțiune a părului. |
| TRICROMIC | care comportă trei culori. |
| TRICROT (PULS) | puls caracterizat prin tricrotism (prezența pe sfigmogramă a două unde secundare pe partea descendentă a curbei). |
| TRICUSPIDĂ | care are trei vârfuri. |
| TRICUSPIDAT | care este prevăzut cu trei vârfuri. |
| TRICUSPIDIAN | care se referă la valva tricuspidadă. |
| TRICUSPIDITĂ | inflamație a valvei tricuspide, cel mai des de origine reumatică și care poate produce insuficiența sau stenoza tricuspidiană. |
| TRIDERMIC | se spune despre orice animal care are trei foițe embrionare. |
| TRIFAZAT | sistem cu trei faze. |
| TRIFID | care este despicat în trei pe o mare parte a lungimii sale. |
| TRIGEMEN | nerv cranian aparținând celei de-a cincea perechi de nervi cranieni. |
| TRIGEMINAL | care se referă la nervul trigemen. |
| TRIGEMINAT | se spune despre un puls caracterizat prin trigeminism (ritm cardiac neregulat, datorat apariției unei extrasistole după două sistole normale). |
| TRIGLICERIDĂ | orice ester al glicerolului cu trei molecule de acid gras. |
| TRIGLICERIDEMIE | concentrația sanguină în trigliceride. |
| TRIGON (OSUL) | os mic, supranumerar, alabei piciorului, reprezentând tuberculul posteroextern al astragalului, independent de acest os și dezvoltat anormal. |
| TRIGON CEREBRAL | comisură a substanței albe constituită din patru pilieri care unesc circumvoluțiunile hipocampului cu corpul mamilar. |
| TRIGON VEZICAL | regiune triunghiulară a mușchiului vezicii urinare, de aspect neted, cuprins între cele două orificii ureterale și orificiul uretral. |
| TRIGONITĂ | inflamație localizată la trigonul vezical. |
| TRIODOTIRONINĂ | unul din principalii hormoni tiroidieni. |
| TRIOBAT | care prezintă trei lobi. |
| TRIOBIȚI | clasă (<i>Trilobita</i>) de artropode, fosile, marine, din care au derivat probabil strămoșii cheliceratelor și ai mandibulatelor; au avut o dezvoltare maximă în cambrian și au dispărut în permian; erau înveliți în chitină, iar pe spate aveau o carapace împărțită prin două șanțuri longitudinale în trei părți distincte: ax sau rachis și două pleure. |
| TRIOCLULAR | care prezintă trei cavități sau trei compartimente. |
| TRINITRINĂ | sin. nitroglicerină. |
| TRIORHIDIE | prezența a trei testicule. |
| TRIPANOSOMIAZĂ | boală parazitară determinată de protozoare flagelate din genul <i>Trypanosoma</i> . |
| TRIPARĂ | femelă care a născut de trei ori. |

| | |
|-------------------------------|--|
| TRIPLEPTIDE | substanțe proteice cu structură mai simplă, rezultate din unirea a trei aminoacizi; sunt substanțe intermediare rezultate în procesul de sinteză a proteinelor, fiind prezente la organele de creștere a plantelor sau pot rezulta în procesul de degradare al proteinelor ceea ce explică prezența lor în nutrețurile fermentate. |
| TRIPLEGIE | hemiplegie asociată cu paralizia unui membru de parte opusă. |
| TRIPLETĂ | în genetică, grup de trei elemente purinice sau pirimidinice din molecula unui acid dezoxiribonucleic sau ribonucleic și care condiționează încorporarea unui acid aminat bine determinat în molecula unei proteine. |
| TRIPLEȚI | trei copii proveniți din aceeași sarcină. |
| TRIPLEX | care se referă la un poliploid, care are trei alele dominante la un anumit locus. |
| TRIPLOIDIE | situație în care se găsește un nucleu al unei celule al cărui set cromozomal cuprinde trei genomuri haploide. |
| TRIPLOPIE | tulburare vizuală caracterizată prin perceperea a trei imagini ale aceluiași obiect. |
| TRIPSINĂ | enzimă a sucului pancreatic provenind din activarea precursorului său, tripsinogenul, sub acțiunea unei enterokinaze și care hidrolizează unele polipeptide, jucând astfel un rol în digestia intestinală a proteinelor. |
| TRIPSINOGEN | formă inactivă a tripsinei. |
| TRIPTAMINĂ | produs de degradare al triptofanului sub efectul enzimelor bacteriene intestinale. |
| TRIPTOFAN | acid aminat prezent în cele mai multe proteine, indispensabil omului, din care derivă mai mulți compuși organici importanți. |
| TRISMIC | care se referă la trismus. |
| TRISMUS | contractie intensă a maxilarelor datorată contracturii permanente a mușchilor masticatori care face dificilă deschiderea gurii. |
| TRISOMIE | stadiu genetic patologic caracterizat prin prezența în celule a unui cromozom supranumerar așezat în vecinătatea celor doi cromozomi omologi de același tip. |
| TRISTEARINĂ | sin. stearină. |
| TRIUNGHII RETROTRAHEAL | triunghi vizibil pe clișeu radiologic al toracelui în profil, limitat în spate prin primele patru vertebre dorsale în sus de partea retrotraheală a orificiului cervico-toracic, în față de peretele posterior al traheei și în jos de convexitatea părții posterioare a crosiei aortice. |
| TRIVALENT | a cărui valență este egală cu 3. |
| TRIVALVĂ | care are trei valve, v. tricuspida. |
| TRIZOMIC | polizomic (aneuploid) la care un cromozom este prezent în triplicat sau în trei doze; se simbolizează $2x+1$. |
| TROCAR | instrument pentru puncție constituit dintr-o tijă metalică cilindrică cu vârf triunghiular și ascuțit, care culisează în interiorul unei canule. |
| TROCHOPHORA | tip de larvă, caracteristică pentru unii viermi, moluște, obișnuit planctonice, cu cili vibratili; larvele iau treptat înfățișarea speciei adulte. |
| TROFIC | care se prezintă în bune condiții de troficitate. |
| TROFISM | proces de hrănire tisulară. |
| TROFOPATIE | boală care afectează nutriția generală. |
| TROHANTER (MARELE) | proeminență patulateră a extremității superioare a femurului situată în prelungirea diafizei osului, aici își au inserția cea mai mare parte a mușchilor coapsei. |
| TROHANTER (MICUL) | apofiză conică a extremității superioare a femurului, situată la unirea colului cu fața internă a corpului osului. |
| TROHANTERITĂ | inflamația marelui sau micului trohanter. |

| | |
|---|---|
| TROHANTERO-CERVICOCAPITAL | care se referă la trohanter, col și capul femural. |
| TROHANTIN | sin. micul trohanter. |
| TROHIN | proeminență a extremității superioare a humerusului situată pe fața anterioară a osului, medial de trohiter. |
| TROHLEAR | în formă de scripete, care se referă la un scripete. |
| TROHLEE | în anatomie, structură în formă de scripete. |
| TROHLEE FEMURALĂ | suprafața articulară anterioară a condililor femurali, articulată cu fața posterioară a rotulei. |
| TROHLEEA HUMERALĂ | extremitatea inferioară și internă, în formă de scripete, a humerusului, care se articulează cu marea cavitate sigmoidă a cubitusului. |
| TROISIER (GANGLIONUL) | ganglionul limfatic cel mai intern al lanțului arterei cervicale transverse. |
| TROMB | sin. trombus; cheag de sânge format în vene sau în artere. |
| TROMBANGEITĂ OBLITERANTĂ | afecțiune a bărbaților tineri, atingând în special arterele și venele extremităților. |
| TROMBASTENIE | modificare a formei și proprietăților trombocitelor care antrenează tulburări ale hemostazei, chiar dacă numărul acestora este normal sau chiar crescut. |
| TROMBECTOMIE | ablația chirurgicală a unui cheag vascular după incizia peretelui vasului. |
| TROMBELASTOGRAFIE | tromboelastografie. |
| TROMBELASTOGRAMĂ | tromboelastogramă. |
| TROMBINĂ | enzimă care provine din activarea protrombinei plasmatice și care transformă fibrinogenul în fibrină. |
| TROMBINOFORMARE | timpul de coagulare în cursul căruia protrombina este transformată în trombină. |
| TROMBINOGEN | sin. protrombină. |
| TROMBOANGEITĂ | inflamarea pereților vaselor sanguine asociată cu tromboză. |
| TROMBOARTERITA | arterită complicată cu tromboză. |
| TROMBOCIT | (gr. <i>thrombos</i> – cheag; <i>kytos</i> - celulă), element figurat anucleat al sângelui circulant; are rol în coagularea sângelui atât direct prin aglutinare, cât și prin formarea unor substanțe cum este trombokinaza, care asigură formarea tromboplastinei. |
| TROMBOCITAR | care se referă la trombocite, sin. pachetar. |
| TROMBOCITEMIE | sin. trombocitoză; creșterea numărului trombocitelor peste limita superioară normală. |
| TROMBOCITOPATIE | sin. trombopatie. |
| TROMBOCITOPENIE | scăderea numărului absolut al trombocitelor circulante, care se produce în diferite stări fiziologice sau patologice. |
| TROMBOCITOPENIE ACUTĂ IDIOPATICĂ | afecțiune caracterizată prin hemoragii cutanate și viscerale, datorate unei scăderi a numărului trombocitelor circulante sub 100.000 elemente/mm ³ . |
| TROMBOCITOPOIEZĂ | formarea trombocitelor. |
| TROMBOCITOZĂ | sin. trombocitemie: creșterea numărului trombocitelor peste limita superioară normală. |
| TROMBODINAMOGRAFIE | sin. tromboelastografie. |
| TROMBODINAMOGRAMA | sin. tromboelastogramă. |
| TROMBOELASTOGRAFIE | procedeu global de studiu al homeostazei bazat pe măsurarea elasticității sângelui în curs de coagulare, apoi a cheagului, cu ajutorul tromboelastografului, aparat care permite studiul simultan a numeroși factori și stadii ale coagulării. |
| TROMBOELASTOGRAMA | traseu grafic înregistrat fotografic cu ajutorul tromboelastografului. |

| | |
|--------------------------------|--|
| TROMBOEMBOLIE | ocluzia unui vas sanguin ca urmare a trecerii succesive de cheaguri sanguine provenind de la o tromboză situată în amonte. |
| TROMBOEMBOLIE PULMONARĂ | obstrucția vaselor sanguine pulmonare prin cheaguri care iau naștere în circulația extrapulmonară, cu precădere în venele profunde ale gambei, venele bazinului sau în inima dreaptă. |
| TROMBOFILIE | stare caracterizată prin tendința hipercoagulabilității sângelui având diferite cauze: vasculare, sanguine, metabolice sau medicamentoase. |
| TROMBOFLEBITĂ | proces mixt de inflamație a peretelui venos și de coagulare intravasculară, primul fiind mai des momentul inițial. |
| TROMBOGEN | care produce o tromboză. |
| TROMBOGENEZĂ | formarea cheagului în timpul procesului de coagulare. |
| TROMBOKINAZĂ | tromboplastină de origine tisulară. |
| TROMBOLIZĂ | dizolvarea unui cheag prezent în circulația sanguină. |
| TROMBOPATIE | orice afecțiune datorată unui deficit calitativ al trombocitelor. |
| TROMBOPENIE | reducerea numărului trombocitelor circulante. |
| TROMBOPLASTINĂ | ansamblul de substanțe care intervin în coagulare transformând protrombina în trombină. |
| TROMBOPLASTINO-FORMARE | formarea tromboplastinei endogene, intravascular, în cursul coagulării sângelui. |
| TROMBOPLASTINOGEN | factor VIII al coagulării, activator al tromboplastinei plasmatică. |
| TROMBOPOIEZĂ | 1. sin. trombocitopoieză; 2. sin. trombogeneză. |
| TROMBOSPONDINĂ | lipoproteină secretată de granulele plachetelor sanguine sub efectul trombinei. |
| TROMBOSTATIC | care împiedică formarea cheagurilor sanguine. |
| TROMBOSTAZĂ | stază circulatorie favorizând formarea de tromboze în vase, cel mai adesea la nivelul membrelor inferioare. |
| TROMBOSTENINĂ | proteină prezentă în trombocite cu rol în retracția cheagului. |
| TROMBOTEST | metodă de control al tratamentului anticoagulant folosind derivați de dicumarină și care presupune evaluarea celor 4 factori de coagulare care sunt modificați prin acești produși. |
| TROMBOTIC | care are ca efect (secundar) formarea de trombuși. |
| TROMBOZĂ | formarea unui cheag în interiorul unui vas sanguin sau unei cavități cardiace. |
| TROMBUS | cheag sanguin obliterant. |
| TROMPA LUI EUSTACHIO | conduct fibrocartilagos descoperit de anatomistul italian Bartolomeo Eustachio (1500-1574), care face legătura între cavitatea timpanică și faringe, la vertebraele tetrapode. |
| TROMPĂ UTERINĂ | organ pereche tubular la mamiferele femele, care asigură legătura între ovar și uter. |
| TRONCULAR | care se referă la un trunchi vascular sau nervos. |
| TROPISM | reacție de orientare a vegetalelor sau animalelor ca urmare a efectului diferiților agenți fizici sau chimici externi. |
| TROPOCOLAGEN | proteină macromoleculară solubilă, produsă de fibroblaști, precursori a colagenului în țesutul conjunctiv. |
| TROPOMIOZINĂ | proteină musculară predominantă în miofibrele musculare netede; este o proteină asimetrică, polimeră, a cărei masă moleculară variază în funcție de specie. |
| TRUNCHI | 1. partea medie a corpului uman legată de cap prin gât și care poartă cele patru membre; 2. nerv sau vas de mare calibru care este la originea ramurilor sale. |
| TRUNCHI CELIAC | ramură colaterală a aortei abdominale, scurtă și foarte groasă, care naște de pe față anterioară a acesteia la nivelul vertebrei a 12-a dorsale și se termină la nivelul marginii superioare a pancreasului. |

| | |
|--------------------------------|---|
| TRUNCHI CEREBRAL | ansamblul format din bulb, protuberanță și mezencefal, situat în foza cerebrală posterioară. |
| TRUNCUS ARTERIOSUS | malformație congenitală în care un vas mare, unic, naște la baza inimii dând naștere arterelor coronare, pulmonare și sistemice. |
| TRYPANOSOMA | gen de flagelate cu corp fuziform, efilat, paraziți în sângele multor animale și la om, ușor de indentificat datorită diametrului lor mai mare decât al elementelor figurate din sânge. |
| T.S. | abr. timp de sângerare. |
| TSE-TSE (MUSCA) | muscă din genul <i>Glossina</i> dotată cu o pereche de aripi și o trompă cu care înțeapă și care trăiește în Africa tropicală. |
| T.S.H. | abr. hormonul de stimulare a tiroidei (thyroidea stimulating hormone). |
| T-TAB | vaccin T-TAB. |
| T.T.H. | abr. tirotrofină. |
| T.T.L. | abr. test de transformare limfoblastică. |
| TUB | în anatomie, canal natural. |
| TUB CAPILAR | tub foarte fin, cu diametru inferior unui mm, utilizat în diferite analize de laborator. |
| TUB DIGESTIV | partea aparatului digestiv prin care trec alimentele și unde suportă transformări care le fac asimilabile. |
| TUB DISTAL | segment de tub urinifer, care pleacă din glomerulul renal. |
| TUB PROXIMAL | segment de tub urinifer, cel mai apropiat de glomerulul renal. |
| TUB URINIFER | tub care conduce urina din glomerul până la papila renală. |
| TUBA ACUSTICĂ | formațiune canaliculară de comunicare între faringe și urechea mijlocie, la cabaline și camelide fiind fisurată ventral, permițând mucoasei să hernieze, dând naștere astfel pungilor guturale. |
| TUBAJ | introducerea unui tub într-un conduct sau într-o cavitate naturală în scopul prelevării sau evacuării de secreții. |
| TUBAR | 1. care se referă la trompa Eustachio; 2. care se referă la trompa Fallope. |
| TUBER | unul dintre lobulii vermiculari aparținând lobului posterior al neocerebelului. |
| TUBERCUL | 1. în anatomie, mic nodul rotunjit și proeminent, situat pe suprafața unui organ sau a unui os; 2. în anatomia patologică, mici aglomerări nodulare constituite într-un țesut prin aglomerarea de celule de diferite tipuri, după natura afecțiunii care le generează, în particular nodulul tuberculos. |
| TUBERCULIDĂ | manifestare cutanată care traduce o reacție alergică la tuberculoză, dar în care nu se găsește bacilii tuberculoși. |
| TUBERCULII CVADRIGEMENI | cele patru eminente albe, rotunjite, care ocupă partea posterioară a plafonului mezencefalului de o parte și de alta a liniei mediane. |
| TUBERCULINĂ | substanță extrasă din culturile de bacili tuberculoși. |
| TUBERCULINO-DIAGNOSTIC | diagnosticul tuberculozei prin testul la tuberculină. |
| TUBERCULIZARE | 1. invadarea organismului prin bacilii tuberculoși; 2. în anatomia patologică, formarea de tuberculi sau transformarea unui infiltrat în tuberculi. |
| TUBERCULOID | 1. care are forma unui tubercul; 2. care se aseamănă tuberculozei. |
| TUBERCULOS | 1. care se referă la tuberculoză; 2. care are tuberculoză. |

MIC DICȚIONAR BIO-MEDICAL

*Cristina R.T.,
Dumitrescu Eugenia,
Teușdea V.,
Boboloaca I.*

| | |
|--------------------------------------|--|
| TUBERCULOSTATIC | 1. substanță care inhibă înmulțirea bacilului tuberculos; 2. substanță medicamentoasă eficientă în tratamentul tuberculozei prin acțiune antimicrobiană specifică. |
| TUBERCULOZĂ | boală contagioasă dintre cele mai vechi și mai răspândite, determinată de bacilul Koch. |
| TUBERCULOZĂ MENINGIANĂ | v. infecția tuberculoasă primară. |
| TUBERCULOZĂ MILIARĂ | v. infecția tuberculoasă primară. |
| TUBERCULOZĂ PLEURALĂ | inflamația pleurală cu epanșament, caracterizată prin prezența de tuberculi miliari în pleură și care se însoțește de tuberculoza pulmonară și uneori pericardică sau peritoneală. |
| TUBEROZITAR | care se referă la o tuberozitate. |
| TUBEROZITATE | parte proeminentă și rotunjită a unui os, uneori și a altei structuri anatomice. |
| TUBEROZITATE (MICA) GASTRICĂ | sin. antru piloric. |
| TUBEROZITATEA GASTRICĂ (MARE) | partea cea mai înaltă și mai voluminoasă a stomacului situată la stânga și deasupra porțiunii abdominale a esofagului. |
| TUBEROZITATEA HUMERUSULUI | sin. trohiter (marea), sin. trohim (mica) |
| TUBOABDOMINAL | care se referă la trompa Fallope și la cavitatea abdominală. |
| d-TUBOCURARINĂ | alcaloid al curarei folosit ca relaxant muscular în anestezie și unele stări convulsive precum și ca antidot al atropinei. |
| TUBOOVARIAN | sin. cu salpingoovarian. |
| TUBOOVARITĂ | sin. salpingoovarită. |
| TUBOTIMPANIC | care se referă la trompa Eustachio la membranele timpanului. |
| TUBOUTERIN | care se referă la trompa Fallope și la uter. |
| TUBUL | tub mic. |
| TUBUL RENAL | sin. tub urinifer. |
| TUBULI MALPIGHI | glande tubulare, cu funcții excretoare, care se deschid în intestinul insectelor, arahnidelor și miriapodelor. |
| TUBULAR | care are forma unui tub. |
| TUBULONEFRITĂ | afecțiune renală datorată leziunii tubilor uriniferi. |
| TUBULOS | care are formă de tub, care este format din tuburi. |
| TULAREMIE | antropozoonoză endemoepidemică cu focalitate naturală provocată de <i>Pasteurella tularensis</i> . |
| TULARINĂ | antigen preparat dintr-o cultură de <i>Pasteurella tularensis</i> , servind la diagnosticul tularemiei. |
| TULPINĂ | organ vegetativ, la cormofite; servește la conducerea sevei; pe ea se dezvoltă ramuri și muguri, la nivelul nodurilor, cresc frunze și organele de reproducere sexuată. |
| TUMEFACȚIE | umflătură care apare într-o parte a corpului, fiind provocată de tulburări ale circulației sângelui sau a limfei |
| TUMEFIAT | care este umflat, care a suferit o tumefacție. |
| TUMESCENT | care se umflă. |
| TUMOARE | proliferație celulară fără caracter de regenerare, cu o importantă independență în raporturile sale cu țesuturile învecinate, având caractere biologice deosebite |

| | |
|-----------------------------------|--|
| TUMORĂ | (lat. <i>tumor</i> - <i>umflătură</i>), sin. tumoare; proliferare celulară fără caracter de regenerare, cu o importanță independentă în raporturile sale cu țesuturile învecinate, având caractere biologice deosebite |
| TUMORĂ DERMOIDĂ ABDOMINALĂ | sin. fibromatoză abdominală. |
| TUMORĂ GLOMICĂ | sin. glomus. |
| TUMORĂ MALIGNĂ SECUNDARĂ | sin. metastază. |
| TUMORECTOMIE | ablația chirurgicală a unei tumori fără exereza țesuturilor învecinate. |
| TUMORIGEN | sin. oncogen. |
| TUNEL CARPIAN | v. canal carpian. |
| TUNEL TARSIAN | v. canal tarsian. |
| TUNELIZATOR | tijă rigidă permițând forajul atraumatic de tunele subperitoneale sau subcutanate, utilizate pentru șunturi vasculare protetice sau venoase. |
| TUNICA VAGINALĂ | tunică seroasă care constituie învelișul cel mai intern al testiculului. |
| TUNICĂ | în anatomie, membrană care învelește unele organe sau care face parte din peretele unui vas, unei artere sau organ cavitat. |
| TUNICILE OCHIULUI | amsablul de 3 membrane concentrice care constituie peretele globului ocular. |
| TURBARE | sin. rabie; boală infecțioasă, inoculabilă, virotică, transmisibilă prin mușcătura unui animal turbat, mortală, distingându-se o formă paralică și o formă furioasă. |
| TURBIDITATE | aspect tulbure al unui lichid cu suspensii de particule solide nedizolvate. |
| TURBELARIATE | clasă (<i>Turbellaria</i>) de viermi platelminți acvatici, cu epiderma acoperită cu cili vibratili. |
| TURGESCENT | care este tumefiat prin aport crescut de sânge. |
| TURGESCENTĂ | creșterea de volum a unui țesut sau organ provocată de aport crescut de sânge venos. |
| TURNER (SINDROM) | sindrom plurimalformativ, caracterizat prin nanism moderat, infantilism ovarian, malformații osoase diferite, cauza este o anomalie cromozomială (cromozon XO în loc de XX). |
| TURNOVER | neologism care se referă la intensitatea și viteza de metabolizare a unei substanțe oarecare |
| TUSE | (lat. <i>tussis</i>), reflex fiziologic complex care poate fi de asemeni produs voluntar, care constă dintr-o inspirație profundă cu închiderea glotei, urmată de o expirație bruscă sacadată și zgomotoasă destinată să expulzeze din căile respiratorii orice substanță care irită sau care împiedică respirația. |
| TUSE CONVULSIVĂ | boală infecțioasă acută, contagioasă și epidemică provocată de <i>Bordetella pertussis</i> . |
| TUSIGEN | care provoacă tusea. |
| TUȘEU | 1. procedeu de explorare a unei cavități naturale cu ajutorul unui sau mai multor degete care se introduc în aceste cavități; 2. tact. |
| T.V. | abr. tușeu vaginal. |
| TWEEN | copolimeri ai polisorbatiilor cu oxidul de etilenă |
| TYLAN | sin. tylozin, biostimulator, conținând un antibiotic de fermentație, activ în micoplasmoza aviară, sinuzita infecțioasă a curcilor, spirochetoză etc. |
| TYR | simbolul tirozinei. |